

استمارة خلاصة بحث

عنوان البحث باللغة العربية: جاهزية مستشفيات العزل لإدارة مخاطر كوفيد-19 وتأثيرها على مشاركة الممرضات في العمل أثناء الجائحة

ملخص البحث باللغة العربية

عنوان البحث باللغة العربية:

جاهزية مستشفيات العزل لإدارة مخاطر كوفيد-19 وتأثيرها على مشاركة الممرضات في العمل أثناء الجائحة

المقدمة:

يتحمل طاقم التمريض العبء الرئيسي للعمل في مستشفيات العزل، حيث زادت ساعات العمل التي تمتد حتى 12 ساعة من العمل المستمر إلى جانب الجهد الكبير المطلوب لرعاية المرضى المعزولين، حيث يتلقى المرضى الخاضعون للعزل مستوى مختلف من الرعاية التمريضية ولديهم مخاطر أعلى لحدوث الضرر أعلى من المرضى غير المعزولين. غالبًا ما يخشى طاقم التمريض من الإصابة بعدوى من المرضى المعزولين. أثر جائحة Covid-19 على الممرضين جسديًا ونفسيًا "الممرضين أكثر عرضة للإصابة بعدوى Covid-19 من عامة الناس بسبب الاتصال المتكرر بالأفراد المصابين، وقد طُلب منهم العمل في ظل ظروف مرهقة دون معدات واقية مناسبة واتخاذ قرارات صعبة تتضمن الآثار الأخلاقية. أصبحت المشاركة في عمل الممرضين عاملاً مهماً من الناحية الاستراتيجية نتيجة النقص العالمي في عدد الممرضين الذين يمثلون أكبر مجموعة من مقدمي الرعاية الصحية، في عصر Covid-19، يتعرض الممرضون الذين يعملون في العزل للإرهاق الشديد، و الضيق وخطر الإصابة بالمرض؛ فهم يتحملون العبء الأكبر المتمثل في كونهم خط الدفاع والمستجيب الأول.

الهدف من البحث: تهدف الدراسة إلى تقييم استعداد مستشفيات العزل لإدارة مخاطر Covid-19 وتأثيره على مشاركة الممرضات في العمل أثناء تفشي المرض.

تصميم البحث: تم إجراء دراسة وصفية مقطعية بين الممرضين/ات الذين يعملون في مستشفيات العزل- مصر.

مكان البحث: أجريت الدراسة في مستشفيات العزل في مصر، بناءً على ملء الممرضين/ات الذين يعملون في مستشفيات لعزل. تم تقديم الاستبيان من خلال رابط URL الخاص بالبحث الموجود على شبكة الإنترنت.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS_f0qkqAts6_C4etR8iFIA8Ak1w2J0483_jcQ60B7

[VXDPgpCzw/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS_f0qkqAts6_C4etR8iFIA8Ak1w2J0483_jcQ60B7/VXDPgpCzw/viewform?usp=sf_link).

عينة البحث: اشتملت العينة على الممرضين/ات (443) العاملون في في مستشفيات العزل في مصر ويقبلون تضمينهم في الدراسة خلال وقت جمع البيانات.

أدوات جمع البيانات: تم استخدام أداتين لجمع البيانات لهذه الدراسة.

أداة جمع البيانات: تم استخدام أداتين لجمع البيانات بعد ترجمتها إلى اللغة العربية على النحو التالي:

الأداة الأولى: استبيان إدارة المخاطر Covid-19 تم تطويره من قبل الباحثين بناءً على المبادئ التوجيهية ومراجعة نوع المراجع ذات الصلة ، ويتكون من جزأين، الجزء الأول المتعلق ببيانات الخصائص الشخصية للممرضات بما في ذلك ؛ العمر والجنس والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي للتمريض والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة وحضور التدريب حول إدارة مخاطر Covid-19. يتعلق الجزء الثاني بتقييم إدارة مخاطر COVID-19 ، ويتألف من 73 عنصراً تم تجميعها في مجموعات فرعية 6 على النحو التالي: (1) لجنة إدارة المخاطر 9 عناصر ، (2) إدارة المخاطر النفسية 13 عنصراً ، (3) إدارة المخاطر المادية 13 عنصراً ، (4) إدارة المخاطر البيئية ومخاطر بيئة العمل 12 عنصراً ، (5) المخاطر المرتبطة بحالات الطوارئ 11 عنصراً ، (6) إدارة مخاطر المريض 15 عنصراً. كانت الاستجابات الثلاثة الممكنة لكل عبارة: نعم = 2 ، لا = 1 ، لا أعرف = 0. واعتبرت إدارة مخاطر غير مرضية >75٪ وإدارة مخاطر مرضية <75٪.

الأداة الثانية: استبيان لتقييم مشاركة الممرضات في العمل ، ويتكون من 32 عنصراً مقسماً إلى 3 مقاييس فرعية وهي (1) عنصر 11 عنصر (2) تخصيص 10 عناصر (3) الاستيعاب 11 عنصر. تم تسجيل الردود على مقياس ليكرت المكون من خمس نقاط والذي تم فيه تصنيف الاستجابات الخمس الممكنة لكل عبارة من أبداً = 1 نادرًا = 2 أحيانًا = 3 ، في الغالب = 4 دائماً = 5، ثم أبداً ونادرًا ما يعتبر منخفضًا ، وأحيانًا يعتبر متوسطًا وفي الغالب يعتبر مرتفعًا .

النتائج: كشفت هذه الدراسة أن حوالي نصف (53.7٪) المستويات الإجمالية لإدارة مخاطر Covid-19 كانت غير مرضية (>75٪) ، بينما كان أقل من نصفهم (44.9٪) لديهم مستوى متوسط من المشاركة في العمل أثناء تفشي Covid-19. متوسط درجات إدارة مخاطر Covid-19 ومشاركة عمل الممرضات فيما يتعلق بالسمات الشخصية؛ هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عالية ($p \leq 0.01$) بين متوسط الدرجات لإدارة مخاطر Covid-19 الشاملة مع العمر والجنس وسنوات الخبرة، وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية ($p \leq 0.05$) مع المستوى التعليمي للتمريض والمسمى الوظيفي .

فيما يتعلق بمشاركة عمل الممرضات؛ هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عالية ($p \leq 0.01$) بين مشاركة عمل الممرضة والمسمى الوظيفي لها ، وعلاقة ذات دلالة إحصائية مع جنسهم كانت هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عالية بين إدارة مخاطر Covid-19 ومشاركة عمل الممرضات. ($P = 0.000$)

الخلاصة: هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عالية ($p \leq 0.01$) بين المقاييس الفرعية لإدارة مخاطر Covid-19 الشاملة والمقاييس الفرعية لمشاركة الممرضات في العمل . لذلك يجب أن تكون مستشفيات العزل مستعدة للوصول المحتمل لمرضى (كوفيد -19)، كما أن طاقم التمريض لديها يجب أن يكون مدربًا تدريبًا جيدًا ومجهّز وقادر على التعامل مع هؤلاء المرضى. تصبح مشاركة الممرضين/ات في العمل مفهومًا تحفيزيًا، مما يعني أنه عندما تشارك الممرضة في عملها، فإن هذا يعزز الشعور بالدافع لبذل قصارى جهدنا للوصول إلى هدف صعب.

التوصيات: هناك حاجة إلى بناء سياسة طويلة الأجل، وتخطيط واستراتيجيات متقدمة للموارد البشرية لدعم مؤسسات الرعاية الصحية على وجه التحديد، وهو أمر بالغ الأهمية للاستجابة بشكل صحيح لأي حالة طوارئ متوقعة في المستقبل. توافق برامج التعليم المستمر للممرضات مع أنظمة الرعاية الصحية المعاد تصميمها استنادًا إلى ممارسة أدلة المخاطر لـ Covid-19 لتحقيق نظام رعاية صحية مستدام مع ممرضة من ذوي الخبرة والمهارة في السيطرة على العدوى.

اسم مقدم البحث

د/ خضره محمد عطيه

