

المجلس الأعلى للجامعات

نموذج رقم (٢)

اللجنة العلمية الدائمة للتمريض
استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفى بواسطة المتقدم:

نوع البحث: فردى

رقم البحث: (٧)

عنوان البحث باللغة الإنجليزية:

Parents Adjustment for Caring of Cerebral Palsy Children

عنوان البحث باللغة العربية:

تعديل رعاية الأباء لاطفال الشلل الدماغي

أسماء المشاركين في البحث:

د/ منال منصور مصطفى: مدرس بقسم تمريض صحة المجتمع كلية التمريض - جامعة الفيوم
أ.م.د/ حنان ثروت البهنساوي: استاذ مساعد بقسم تمريض اطفال كلية التمريض - جامعة المنوفية
د/ جوزفين لاوند: استاذ مساعد بقسم تمريض اطفال كلية التمريض - جامعة المنصورة

جهة النشر:

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSRJNHS) e-ISSN: ٢٣٢٠-
Oct. ٢٠١٥), PP ٠١- ١٩٥٩.p-ISSN: ٢٣٢٠-١٩٤٠ Volume ٤, Issue ٥ Ver. II (Sep.

١٠

هل البحث معتمد على رسالة: نعم () لا (√)

الملخص:

مقدمة: تشخيص الأطفال المصابين بالشلل الدماغي يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الاستجابات العاطفي للأباء و **هدف البحث:** هدفت الدراسة إلى تقييم التدخل التمريض لتكيف الوالدين لرعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي .

مكان البحث: قد أجريت هذه الدراسة في عيادة الأمراض العصبية في العيادات الخارجية لمستشفى جامعة عين شمس.

عينة وطرق البحث: اشتملت الدراسة على تصميم البحوث التجريبية واستخدام عينة مقصودة من ١٢٠ طفل في هذه الدراسة.

أدوات الدراسة: شمل الاستبيان إجراء مقابلات التي تشمل علي أربعة أجزاء. الجزء الأول: الخصائص الاجتماعية للطفل ورعايته. الجزء الثاني: أثر الأسرة علي اعاقه الطفل. الجزء الثالث الشعور بالقلق مع تقييم إعالة الأطفال في أنشطة الحياة اليومية. الجزء الرابع تقييم الرعاية حول احتياجات الرعاية الصحية للطفل مع الشلل الدماغي.

النتائج: كشفت الدراسة أن أكثر من نصف الأطفال كانوا الأولاد. أيضاً، كان أكثر من نصف مقدمي الرعاية امهات أثر تكيف عائلة الطفل مع الشلل الدماغيو ثلاثة أرباع الأباء لديهم اختلال روتين الأسرة العادية. كان الأطفال مستقلين عن والديهم في معظم الأنشطة اليومية، في حين كانت هناك اختلافات إحصائية في برنامج ما قبل وما بعد.

الخلاصة: من النتائج أن هناك تحسن بعد تنفيذ البرنامج، ومتابعة في كل جوانب تأثير عائلة الطفل مع الشلل الدماغي، والتبعية في أنشطة الحياة اليومية والاحتياجات الصحية للأطفال.

التوصيات: أوصت هذه الدراسة ضرورة تحسين التعديلات للامهات تجاه رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ببرامج التنقيف الصحي المستمر.

امضاء مقدم البحث

اسم مقدم البحث

منال منصور مصطفى

مدرس تمريض صحة المجتمع - كلية التمريض - جامعة الفيوم

ملخص البحث باللغة العربية (البحث السابع)

- تعديل رعاية الأباء لاطفال الشلل الدماغى

مقدمه الدراسة:

ممرضة لديها لإشراك الأسرة في الرعاية، وتعليم جانباً أساسياً من جوانب الرعاية. تعزيز شرح الطبيب للإدارة الطبية؛ أهمية الضغط الرعاية للمرضى الخارجيين الجارية ومتابعة الزيارات. يشير الى \ يرجع الى مجموعة دعم خاصة ووكالات للذهاب الدعم؛ ونؤكد الحاجة إلى برنامج ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ممرضة لديها لتعليم مجموعة من التمارين الحركة للعائلة وأداء التمارين لجميع مفاصل الجسم كل ٤-٢ ساعات. ممرضة لديها لتشجيع النشاط المستقل الإمكان، أن تكون في حالة تأهب لقيود، وتجنب الإفراط في الحماية

الهدف من الدراسة:

قد أجريت هذه الدراسة في عيادة الأمراض العصبية في العيادات الخارجية لمستشفى جامعة عين شمس

تصميم البحث:

تم استخدام تصميم شبه تجريبية لهذه الدراسة..

مكان الدراسة :

- قد أجريت هذه الدراسة في عيادة الأمراض العصبية في العيادات الخارجية لمستشفى جامعة عين شمس.

عينة البحث:

- اشتملت الدراسة على تصميم البحوث التجريبية واستخدام عينة مقصودة من ٢٠ طفل في هذه الدراسة.

طرق جمع البيانات:

تم جمع البيانات باستخدام

الاستبيان إجراء مقابلات التي تشمل علي أربعة أجزاء. الجزء الأول: الخصائص الاجتماعية للطفل ورعايته. الجزء الثاني: أثر الأسرة علي اعاقه الطفل. الجزء الثالث الشعور بالقلق مع تقييم إعالة الأطفال في أنشطة الحياة اليومية. الجزء الرابع تقييم الرعاية حول احتياجات الرعاية الصحية للطفل مع الشلل الدماغى.

النتائج:

في برنامج ما كشفت الدراسة أن أكثر من نصف الأطفال كانوا الأولاد. أيضا، كان أكثر من نصف مقدمي الرعاية امهات أثر تكيف عائلة الطفل مع الشلل الدماغيو ثلاثة أرباع الآباء لديهم اختلال روتين الأسرة العادية. كان الأطفال مستقلين عن والديهم في معظم الأنشطة اليومية، في حين كانت هناك اختلافات إحصائية قبل وما بعد.

الخلاصة:

بناء على نتائج هذه الدراسة وفرضيات البحث، خلصت إلى أن أكثر من نصف الأطفال تراوحت أعمارهم بين ٦ سنوات إلى أقل من ٩ سنوات ومعظمهم من الذكور، في حين أن مقدمي الرعاية لهم أمهات. وفيما يتعلق أثر عائلة الطفل التكيف مع الشلل الدماغي كانت جميع الآباء والأمهات لبنود البرنامج الإحصائي كبير آخر حول تحسين رعاية الطفل جلبت أسرة أقرب إلى الله وتكلفة مالية إضافية بعد تدخل، كان الأطفال مستقلة على والديهم في معظم الأنشطة اليومية، في حين كانت هناك اختلافات إحصائية في برنامج ما قبل وما بعد. بالإضافة إلى ذلك، إلى ما قبل ومتابعة لجميع الجوانب مثل التغذية، التعب، والمشي، والملابس، والاستحمام، ومهارات الاتصال القضاء، كانت هناك تحسينات بعد تنفيذ البرنامج لجميع جوانب الأطفال ذوي الاحتياجات كما العناية بالأسنان، وتمارين التنفس، وكثرة الحديث ل الطفل، واستخدام سادة لينة للنوبات، وتجنب لوقف التشنجات أثناء نوبة، والحفاظ على الرأس في الوضع الطبيعي وتجنب امتداد مفاجئ من أطرافه. كانت هناك فروق في برنامج ما قبل وما بعد مقابل ما قبل والمتابعة.

وقد أوصت الدراسة بالاتي

- أهمية بذل جهود اكبر لاعطاء طلاب التمريض من الذكور فرص جيدة بالتعليم مكافئه لنفس فرص طلاب التمريض من الاناث.
- سلتمرار الأبحاث لاستكشاف اتجاهات طلاب التمريض من الذكور والمعوقات التي يتعرضون لها بهدف ايجاد حلول مناسبة وتحسين نوعية تعليمهم.
- رفع مستوي الوعي المجتمعي لتشجيع الطلاب الذكور علي الالتحاق ببرامج التعليم التمريضيه المختلفه.

إمضاء مقدم البحث

اسم مقدم البحث
منال منصور مصطفى