



نموذج رقم (١)  
اللجنة العلمية الدائمة للتمريض  
استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

رقم البحث: (٢)

### عنوان البحث باللغة العربية:-

تأثير التدخل بقيادة التمريض فيما يتعلق بالوقاية من الجلطات الدموية الوريدية بين النساء المصابات بأورام أمراض النساء التي يخضعن لجراحة كبرى في البطن والحوض

المشاركون في البحث:

### المشاركون في البحث:

استاذ مساعد تمريض صحة الام والرضيع كلية التمريض جامعة الفيوم  
د. م. آيات مسعود عمر مسعود  
د. منيرة سمير عبدالهادي  
د. شيماء جمعة يوسف  
د/ امل عبدالعزيز احمد  
مدرسة تمريض باطنى وجراحي كلية التمريض جامعة دمنهور  
مدرسة تمريض باطنى وجراحي كلية التمريض جامعة دمنهور  
مدرسة تمريض صحة الام وحديثي الولادة كلية التمريض جامعة اسيوط  
مكان النشر:  
(Egyptian Journal of Health Care, 2020, EJHC)

Vol.11No.3-September- pp. 1-20

هل البحث معتمد على رسالة علمية نعم ( ) لا ( √ )

### ملخص البحث:

**الخلفية:** الجلطات الدموية الوريدية ، التي تنطوي على تجلط الأوردة العميقة والانسداد الرئوي ، هي مضاعفة خطيرة تضاعف من خطر الإصابة بالأمراض والوفيات بعد الجراحة الرئيسية في البطن والحوض. **الهدف:** لتقييم تأثير التدخل بقيادة التمريض فيما يتعلق بالوقاية من الجلطات الدموية الوريدية بين النساء المصابات بأورام أمراض النساء الخاضعات لجراحة كبيرة في البطن. **التصميم:** استخدمت هذه الدراسة تصميم شبه تجريبي. **الإعداد:** أجريت هذه الدراسة في قسم أمراض النساء والعيادات الخارجية بمستشفى جامعة الفيوم ومستشفى الفيوم العام ، مصر. **العينة:** عينة هادفة من ١٠٠ امرأة مقسمة عشوائياً إلى مجموعتين ، ٥٠ امرأة لكل مجموعة. **أدوات جمع البيانات:** تم استخدام ثلاث أدوات في هذه الدراسة بما في ذلك استبيان مجدول للمقابلة ، وورقة تقييم عوامل خطر تجلط الأوردة العميقة ، وورقة تقييم تجلط الأوردة العميقة. **النتائج:** النسبة المئوية للمعرفة الجيدة بخصوص التخثر الوريدي زادت بشكل ملحوظ في الاختبار اللاحق مقارنة بالاختبار القبلي بين مجموعة الدراسة (٢٠٪ قبل الاختبار مقابل ١٠٠٪ بعد الاختبار) مقارنة بمجموعة التحكم (٠٪ قبل الاختبار مقابل ٤٠٪ الاختبار اللاحق) (  $p = 0.000$  ) ، أيضاً بعد تنفيذ البرنامج ، تم تحسين النسبة المئوية لمستوى الامتثال الجيد للتدابير الوقائية للجلطات الدموية الوريدية بشكل ملحوظ من قبل جميع مجموعة الدراسة (١٠٠٪) الذين حققوا مستوى جيداً من الامتثال مقارنة بمجموعة التحكم (٤٠٪) (  $p = 0.000$  ). فضلاً عن ذلك؛ كانت هناك حالة واحدة جديدة من التخثر الرئوي بين المجموعة الضابطة وحالتين مصابة بجلطات الأوردة العميقة مقارنة بعدم وجود حالات تم الإبلاغ عنها في مجموعة الدراسة مع وجود فرق ذي دلالة إحصائية عالية  $P = 0.000$ . **الخلاصة:** النساء المصابات بأورام أمراض النساء اللواتي خضعن لعملية جراحية كبرى في البطن واللواتي تعرضن لبرنامج تدخل بقيادة ممرضة لم يتعرضن لتجلط الأوردة العميقة من أولئك اللاتي تعرضن إلى المستشفى الروتيني فقط. **التوصيات:** يجب إضافة التدخل بقيادة التمريض كجزء أساسي من الرعاية الروتينية المحيطة بالجراحة لجميع عمليات أمراض النساء الكبرى.

توقيع مقدم البحث

مقدم البحث

أ.م. / آيات مسعود عمر مسعود