



تأثير الإرشادات التمريضية الموجهة بنموذج بيتر على
الضعف الجنسي والقلق والرضا الزوجي
بين النساء المصابات بالعقم

رسالة

توطئة للحصول على درجة الدكتوراه فى علوم التمريض
(تمريض صحة الأم وحديثى الولادة)

مقدمة من

أمانى فكرى على السيد

مدرس مساعد بقسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة

كلية التمريض - جامعة الفيوم

كلية التمريض - جامعة حلوان

٢٠٢٤



تأثير الإرشادات التمريضية الموجهة بنموذج بيتر على الضعف الجنسي والقلق والرضا الزوجي بين النساء المصابات بالعقم

رسالة

توطئة للحصول على درجة الدكتوراه فى علوم التمريض

(تمريض صحة الأم وحديثى الولادة)

تحت إشراف

ا.د. إنتصار فتوح عبد المنعم

أستاذ و رئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة

كلية التمريض - جامعة حلوان

ا.د. شيماء حسن محمدي

أستاذ تمريض صحة الأم وحديثى الولادة

كلية التمريض - جامعة حلوان

كلية التمريض – جامعة حلوان

٢٠٢٤

الملخص العربي

إن العقم هو عدم القدرة على الحمل بعد عام واحد من الجماع غير المحمي وتؤثر هذه الحالة على حوالي ١٠-١٥٪ من الأزواج في سن الإنجاب. علاوة على ذلك، يتطلب تشخيص العجز الجنسي أن يشعر الزوجان بالضيق الشديد والضغط النفسي لمدة ستة أشهر على الأقل، باستثناء العجز الجنسي الناجم عن المواد أو الأدوية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون القلق رد فعل طبيعي للتوتر الناجم عن العقم. علاوة على ذلك، يعد الرضا الزوجي أحد مؤشرات جودة الزواج. بالإضافة إلى ذلك، فإن نموذج بيترهو نموذج إستشاري يتكون من ست مراحل. علاوة على ذلك، فإن الإرشادات التمريضية المبنية على نموذج BETTER يمكن أن تؤدي إلى تعزيز التفاعل بين الممرضات والنساء وتحقيق نتائج إيجابية للتدخل التمريضي.

كما هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم تأثير الإرشادات التمريضية الموجهة بنموذج BETTER على العجز الجنسي والقلق والرضا الزوجي لدى النساء المصابات بالعقم. كما أجريت الدراسة في عيادة أمراض النساء بمستشفى بنها الجامعي الذي يقع في وسط مدينة بنها في مصر حيث تكونت عينة قصدية من ٦٠ سيدة تعاني من العقم وتم توظيفها في الدراسة وفقا للمعايير التالية: النساء المصابات بالعقم بعد سنة واحدة من الجماع المنتظم دون وقاية والذين مارسوا علاقه الجنسية مع الزوج في الأسابيع الأربعة السابقة.