

أداء الممرضات تجاه رعاية المرضى ذو الأنبوبة الصدرية

رسالة

توطئة للحصول على درجة الماجستير في علوم التمريض
(التمريض الباطني الجراحي)

مقدم من

منال سعد شاكر

بكالوريوس التمريض - جامعة القاهرة
أخصائية تمريض بالمعهد الفني للتمريض - جامعة الفيوم
كلية التمريض - جامعة عين شمس

كلية التمريض
جامعة عين شمس
2012

أداء الممرضات تجاه رعاية المرضى ذو الأنبوبة الصدرية

رسالة مقدمة

توطئة للحصول على درجة الماجستير في علوم التمريض
(التمريض الباطني الجراحي)

تحت إشراف

أ.د. كاميليا فؤاد عبد الله

أستاذة تمريض باطني جراحي

وكيلة الدراسات العليا والبحوث

كلية التمريض - جامعة عين شمس

أ.م.د. منال صلاح حسن

أستاذ مساعد تمريض باطني جراحي

كلية التمريض - جامعة عين شمس

كلية التمريض
جامعة عين شمس
2012

الملخص العربي

مقدمة:

تعتبر الرعاية التمريضية للمرضى ذو الأنبوبة الصدرية من المهارات التمريضية الهامة. وتتفرد الممرضات بدور هام وخاص جدا في كل مراحل تقديم الرعاية التمريضية لهؤلاء المرضى الأمر الذي يتطلب رعاية تمريضية متقدمة ويقظة تمتاز بالخبرة للوقاية من حدوث المضاعفات الخطيرة والإقلال من التعرض للأمراض. والأرجح أن تحدث المضاعفات إذا لم يكن لدى الممرضات القوائم على رعاية هؤلاء المرضى المعلومات والمهارات الكافية.

هدف الرسالة:

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مستوى الأداء التمريضي تجاه رعاية المرضى ذو الأنبوبة الصدرية.

أسئلة البحث:

- 1- ما هو مستوى المعلومات لدى الممرضات القوائم برعاية المرضى ذو الأنبوبة الصدرية؟
 - 2- ما هو مستوى الأداء التمريضي تجاه رعاية المرضى ذو الأنبوبة الصدرية؟
 - 3- ما هي العوامل التي تؤثر على مستوى أداء الممرضات تجاه رعاية المرضى ذو الأنبوبة الصدرية؟
-

طرق البحث:

المكان:

تم إجراء هذه الدراسة داخل وحدة الرعاية المركزة لمرضى جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة عين شمس.

عينة البحث:

كافة الممرضات المتواجدات في المكان المذكور سابقاً ، عددهن (40ممرضة) القائمات بالرعاية التمريضية للمرضى ذو الأنبوبة الصدرية ذو مؤهلات علمية مختلفة وسنوات خبرة مختلفة.

أدوات وطرق جمع البيانات:

1- استمارة الاستبيان: صممت هذه الاستمارة بواسطة الباحثة لتقييم المستوى المعرفي لدى الممرضات فيما يتعلق بالرعاية التمريضية للمرضى ذو الأنبوبة الصدرية، معتمدة على مراجعة الأبحاث والمقالات المتعلقة بهذا الموضوع وشملت على البيانات الديموجرافية للممرضات (السن، المؤهل، سنوات الخبرة والبرامج التدريبية السابقة)، ومعلومات الممرضات تجاه التعامل مع الأنبوبة الصدرية وأيضا العوامل التي تؤثر على الممرضات أثناء الاداء التمريضي.

2- استمارة ملاحظة: واستخدمت لتقييم أداء الممرضات تجاه رعاية المرضى ذو الأنبوبة الصدرية

استغرقت عملية جمع البيانات والمعلومات الفترة من شهر مايو إلى شهر اكتوبر 2011 وقد تم ملاحظة الممرضات خلال فترة العمل الصباحية وما بعد الظهر ، وتم بعدها مراجعة هذه المعلومات وجدولتها وتحليلها بالطرق الإحصائية المناسبة.

مصادقية البحث:

تم مراجعة أدوات البحث من لجنة مكونة من 11 خبير للتأكد من وضوحها، وصلاتها بموضوع الدراسة، وفهمها فهماً كاملاً وقابليتها للتطبيق وسهولة إدارتها، ثم استخدمت بواسطة الباحثة بعد قياس مدى صلاحية، مصداقية، ثبات الاستمارة لتجميع البيانات اللازمة للبحث.

الدراسة الاستكشافية:

تم عمل دراسة استرشادية مصغرة على عينة مكونة من 4 ممرضات (10% من عينة البحث) لعمل اختبار صدق وثبات المحتوى لأدوات البحث وبناءا على نتائج هذه الدراسة تم عمل التعديلات المطلوبة.

نتائج الدراسة:

أشارت النتائج إلى أن 82.5% من الممرضات ليس لديهن المعلومات الكافية عن العناية التمريضية للمرضى ذو الأنبوبة الصدرية. وبالنسبة لمهارات الممرضات تجاه الرعاية التمريضية للمرضى ذو الأنبوبة الصدرية، أوضحت النتائج أن 95% من الممرضات ليس لديهن الكفاءة.

وفيما يخص العوامل التي تؤثر على اداء الممرضات أثناء تقديم الرعاية التمريضية للمرضى ذو الأنبوبة الصدرية فقد تبين أن هناك عوامل خاصة بالمرضة مثل (نقص في عدد الممرضات، نقص في معلومات الممرضة اثناء العمل ، التغيرالمستمر في أماكن الممرضات، نقص في التدريب المستمر، الصراع بين فئات التمريض المختلفة عدم توافر الوقت نتيجة لزيادة الاعمال التمريضية المنسوبة

إليه، نقص فى المراقبة و المتابعة اثناء العمل، عدم الثقة بالنفس وعدم وجود توصيف وظيفي واضح لهيئة التمريض).

وعوامل خاصة ببيئة العمل مثل (عدم توافر إجراءات تمريضية مكتوبة للغيار على مكان الأنبوبة الصدرية، عدم وجود كتب خاصة بالمهارات والإجراءات التمريضية ، عدم توافر إناء تجمع السوائل وبعدهد كافي، عدم توافر إجراءات تمريضية مكتوبة لإتباع الإجراءات اللازمة للتعقيم) وعوامل أخرى خاصة بالمريض مثل (مستوى التعليم ، المريض الغير قادر على التعاون أثناء تقديم الرعاية التمريضية بسبب الألم والحالة النفسية للمريض).

الخلاصة:

بناءا على نتائج الدراسة استخلصت، معظم الممرضات 82.5% ليس لديهن المعلومات الكافية عن العناية التمريضية للمرضى ذو الأنبوبة الصدرية و أن الأغلبية العظمى 95% من الممرضات ليس لديهن الكفاءة بالنسبة لمهارات الممرضات تجاه الرعاية التمريضية للمرضى ذو الأنبوبة الصدرية.

و أيضا يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على أداء الممرضات أثناء تقديم الرعاية التمريضية للمرضى ذو الأنبوبة الصدرية فقد تبين أن هناك عوامل خاصة بالمرضة وعوامل خاصة بالعمل وأخرى خاصة بالمريض.

توصيات البحث:

لكي يتحسن الأداء الفعلي للممرضات أثناء تقديم العناية التمريضية للمرضى ذوالأنبوبة الصدرية في ضوء نتائج الدراسة الحالية نوصى بالآتي:

- 1- توفير التدريب المستمر للممرضات لتحسين المعلومات تجاه الأداء التمريضي للمرضى ذوالأنبوبة الصدرية.
 - 2- توفير الأدوات والإجراءات الخاصة بالرعاية للمرضى ذوالأنبوبة الصدرية في جميع الوحدات والأقسام.
 - 3- تطوير طرق مكافحة العدوى.
 - 4- عمل توصيف وظيفي واضح لهيئة التمريض وأيضاً زيادة أعداد هيئة التمريض من الحاصلين على بكالوريوس تمريض وخاصة في وحدات رعاية جراحة القلب والصدر لرفع مستوى الرعاية التمريضية المعطاة للمرضى ذوالأنبوبة الصدرية .
 - 5- تطوير كتب ومجلات خاصة بهذا المجال لتنمية معرفتهن لكيفية التعامل مع مرضى ذوالأنبوبة الصدرية.
 - 6- أوصت العديد من الدراسات تقييم مدى تأثير وانعكاس البرامج والخدمات التعليمية على أداء الممرضات أثناء تقديم الرعاية التمريضية للمرضى ذوالأنبوبة الصدرية وانعكاس ذلك على تطور حالة المريض.
 - 7- توصيات الطبيب يجب أن تكتب في ملف المريض بوضوح شديد، ويجب أن يحتوي ملف المريض على خطة العناية التمريضية وسجل كامل لكل الملاحظات والمهارات التمريضية المقدمة للمرضى ذوالأنبوبة الصدرية.
 - 8- يوصى بإعادة هذه الدراسة مرة أخرى مع استخدام عينة بحثية أكبر وفي أماكن مختلفة لإمكانية تعميم النتائج.
-

