



ادراك المرضى فيما يتعلق بالعوامل التي تؤدي إلى تفاقم نزيف دوالي المريء

رسالة

توطئة للحصول على درجة الماجستير في علوم التمريض
(تمريض باطنجراحي)

مقدمة من

سلوى كمال عبد الفتاح

معيدة بكلية التمريض جامعة الفيوم

بكالوريوس في علوم التمريض (٢٠١٨)

كلية التمريض

جامعة حلوان

٢٠٢٣



ادراك المرضى فيما يتعلق بالعوامل التي تؤدي إلى تفاقم نزيف دوالي المريء

رسالة

توطئة للحصول على درجة الماجستير في علوم التمريض
(تمريض باطنجراحي)

تحت إشراف

أ.م.د/ بغداد حسين محمود

أستاذ مساعد التمريض الباطني الجراحي
كلية التمريض - جامعة حلوان

د/نورا صلاح الدين سعد

مدرس تمريض الباطني الجراحي
كلية التمريض - جامعة حلوان

كلية التمريض

جامعة حلوان

٢٠٢٣

الملخص العربي

نزيف الدوالي المريئي الحاد هو نتيجة مباشرة لارتفاع ضغط الدم البابي ولا يزال أحد أكثر مضاعفات تليف الكبد فتكا. على مدى العقود الثلاثة الماضية ، انخفض معدل الوفيات بسبب نزيف الدوالي بشكل مطرد مع تحسين العلاجات بالمنظار والدوائي. على الرغم من هذا التحسن في طرق العلاج ، لا يزال النزيف من دوالي المريء مرتفعا في معدل الوفيات (١٥٪ - ٢٠٪) في المرضى الذين يعانون من تليف الكبد الكامن.

الهدف من الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم إدراك المرضى فيما يتعلق بالعوامل التي تؤدي إلى تفاقم نزيف دوالي المريء.

أسئلة البحث:

- ١- ما هو مستوى معرفة المرضى فيما يتعلق بالعوامل التي تؤدي إلى تفاقم نزيف دوالي المريء؟
- ٢- ما هو مستوى إدراك المرضى فيما يتعلق بالعوامل التي تؤدي إلى تفاقم نزيف دوالي المريء؟

العينة وطرق البحث:

اولا: العنصر الفني:

التصميم البحثي:

تم استخدام تصميم بحث وصفي استكشافي في هذه الدراسة.

مكان البحث :

ستجرى هذه الدراسة في وحدة المناظير بمستشفى الفيوم العام

عينه البحث :

م نوع العينة:

- تم إجراء عينة هادفة لاختيار عينة الدراسة وفقاً لمعايير الانضمام التالية:
- المرضى البالغين من كلا الجنسين من سن ١٨ إلى ٦٠ سنة.
 - المرضى الواعين والقادرين على التواصل لفظياً.
 - المرضى الذين لا يعانون من نزيف دوالي المريء النشط.
 - المرضى الذين حضروا وحدة التنظير المعدي للمتابعة فقط بدون تدخل.
 - استعداد المرضى للمشاركة في الدراسة.

حجم العينة:

بناءً على معادلة حجم العينة ، سيشارك في هذه الدراسة (١٥٢) مريضاً يعانون من نزيف دوالي المريء.

ادوات تجميع العينة :

الأداة الأولى: استبيان مقابلة المرضى المنظم: -

تم تطوير هذه الأداة وملؤها من قبل الباحث وتشمل ما يلي:

الجزء الأول: يتضمن هذا الجزء الخصائص الديموغرافية للمريض .

الجزء الثاني: ويختص بالتاريخ الماضي والحاضر لمرضى دوالي المريء .

الجزء الثالث: - معلومات المريض فيما يتعلق بالمرض والعوامل التي تؤدي إلى تفاقم نزيف دوالي المريء.

الأداة الثانية: ادراك المريض للمرض (استبيان إدراك المريض للمرض (IPQ).

النتائج

أوضحت الدراسة الحالية أن ٤٠.٨٪ من أفراد عينة الدراسة تراوحت أعمارهم بين ٤٠-٥٠ سنة، ٤٤.٧٪ منهم إناث و٥٥.٣٪ ذكور. أما بالنسبة للمستوى التعليمي فقد حصل ٤٠.٨٪ منهم على تعليم ثانوي ، بالإضافة إلى أن

٧٣.٧٪ منهم يعانون من التهاب الكبد الفيروسي ، وتم إدخال ٩٤.٧٪ من عينة الدراسة إلى المستشفى بسبب نزيف دوالي المريء من قبل.

فيما يتعلق بالمعرفة الكلية بالمرض فيما يتعلق بنزيف دوالي المريء. كشفت الدراسة الحالية أن ٦٥.٨٪ من المرضى الذين شملتهم الدراسة لديهم مستوى غير مرضى من المعرفة فيما يتعلق بنزيف دوالي المريء ، في حين أن ٣٤.٢٪ منهم لديهم مستوى مرضى من المعرفة.

فيما يتعلق بإدراك المرضى الكلي للمرض ، مثلت الدراسة الحالية أن ٥١.٣٪ من المرضى الذين شملتهم الدراسة لديهم مستوى عال من الإدراك الكلي للمرض ، في حين أن ٣٢.٩٪ منهم لديهم مستوى معتدل من إجمالي الإدراك بينما ١٥.٨ ، كان لديهم مستوى منخفض من الإدراك الكلي وكان المتوسط للإدراك الكلي 111.95 ± 10.32 .

كانت هناك دلالة إحصائية عالية مع وجود ارتباط إيجابي بين درجة المعرفة الإجمالية ودرجة الإدراك . * $p\text{-value} < 0.001$

كانت هناك دلالة إحصائية عالية بين الخصائص الديموجرافية ومستوى المعرفة الكلية وإدراك المرض مع العمر والحالة الاجتماعية ومستوى التعليم ومكان الإقامة * $p < 0.05$.

استنتاج

بناء على نتائج الدراسة الحالية ، يمكن استنتاج ما يلي: أشارت نتيجة الدراسة الحالية إلى أن ما يقرب من ثلثي المرضى الذين تمت دراستهم لديهم مستوى غير مرضى من المعرفة الكلية فيما يتعلق بنزيف دوالي المريء ، مع ما يقرب من نصف المرضى الذين شملتهم الدراسة لديهم مستوى عال من الإدراك الكلي للمرض، في حين أن ما يقرب من ثلثهم لديهم مستوى معتدل من الإدراك الكلي، وخمس العينة التي تمت دراستها لديهم مستوى منخفض من الإدراك الكلي. أيضا ، كان هناك ارتباط ذو دلالة إحصائية عالية مع وجود ارتباط

إيجابي بين درجة * $p\text{-value} < 0.001$ المعرفة الإجمالية ودرجة الإدراك الكلي .

التوصيات:

واستنادا إلى نتائج الدراسة الحالية، اقترحت التوصيات التالية:

- يجب توفير التعليم المستمر للمرضى الذين تمت دراستهم والذين يعانون من نزيف دوالي المريء مع، لأنه جزء أساسي من علاجهم.
 - المتابعة المنتظمة عن طريق المنظار على الأقل كل ستة أشهر لجميع المرضى الذين تمت دراستهم لتقييم حالاتهم الصحية والكشف المبكر عن المضاعفات.
 - تطوير كتيب مبسط وشامل يتضمن معلومات أساسية عن المريء يختلف النزيف من حيث التعريف والأسباب وعوامل الخطر والمضاعفات والوقاية.
- توصيات لمزيد من الأبحاث المستقبلية :
- يجب تكرار الدراسة على نطاق واسع وفي أماكن مختلفة من المستشفيات من أجل تعميم الفوائد.