

تقييم وعى الأمهات فيما يتعلق بالأسعافات الأولية للاختناق بين أطفالهن دون سن الخامسة

رساله

توطئة للحصول على درجة الماجستير
في علوم التمريض
(تمريض صحة الأطفال)

مقدمة من


أسماء عمر محمود محمد

معيد في تمريض صحة الأطفال
كلية التمريض - جامعة الفيوم
(بكالوريوس في علوم التمريض، جامعه الفيوم، ٢٠١٧)

كلية التمريض

جامعة حلوان

٢٠٢٣



تقييم وعى الأمهات فيما يتعلق بالأسعافات الأولية للاختناق بين أطفالهن دون سن الخامسة

رساله

توطئة للحصول على درجة الماجستير
في علوم التمريض
(تمريض الاطفال)

تحت إشراف

أ.د / صفاء صلاح اسماعيل

أستاذ تمريض الاطفال
عميد كلية تمريض، جامعة حلوان

ا.م.د/ فتحية السيد السيد

استاذ مساعد تمريض الاطفال
رئيس قسم تمريض الاطفال - جامعه الفيوم

كلية التمريض

جامعة حلوان

٢٠٢٣

الملخص العربي

المقدمة:

الاختناق هو حالة طارئة تهدد الحياة وبالتالي وجود جسم غريب في الشعب الهوائية هي حالة طبية طارئة تتطلب التشخيص والعلاج في الوقت المناسب، وإذا لم يتم التعرف عليه يمكن أن يؤدي إلى عدد من المضاعفات الخطيرة عند الأطفال. لذا يجب رفع مستوى الوعي العام وتنقيف الأمهات ومقدمي الرعاية الآخرين حول جميع جوانب هذا الموضوع، وبالتالي فإن تحسين معرفة الأمهات يمكن أن يقلل من مخاطر الاختناق التي تهدد الحياة.

الهدف من الدراسة

استهدفت الدراسة إلى تقييم وعي الأمهات فيما يتعلق بالإسعافات الأولية للاختناق بين أطفالهن دون سن الخامسة من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

١. ما هو مستوى معرفة الأمهات فيما يتعلق بالإسعافات الأولية للاختناق؟
٢. ما هي ممارسات الأمهات فيما يتعلق بالإسعافات الأولية من الاختناق؟
٣. هل لدى الأمهات مواقف إيجابية تجاه الإسعافات الأولية للاختناق؟
٤. هل هناك علاقة بين معرفة الأم واتجاهاتها وممارستها فيما يتعلق بالإسعافات الأولية للاختناق؟

الموضوع والطريقة:

موضوع وطرق هذه الدراسة تم وصفها في إطار البنود الأربعة الرئيسية التالية، الفنية والتشغيلية والإدارية والإحصائية.

اولا: البند الفني:

تضمن العنصر الفني تصميم البحث وإعداده وموضوعه وأدوات جمع البيانات.

تصميم البحث:

تم استخدام تصميم بحث وصفي لإجراء هذه الدراسة.

مكان البحث:

أجريت هذه الدراسة بعيادات الأطفال الخارجية التابعة لمستشفى الفيوم العام.

نوع العينة:

تم استخدام عينة ملائمة من الأمهات اللاتي لديهن أطفال دون سن الخامسة في هذه الدراسة لجمع البيانات على مدار ٦ أشهر (من يوليو / ٢٠٢٢ إلى ديسمبر / ٢٠٢٢). وتألفت من ١١٠ أمهات حضرن مكان الدراسة الذين تم اختيارهم بناءً على المعايير المطلوبة.

أدوات جمع البيانات:

تم جمع البيانات من خلال استخدام الأدوات التالية:

الأداة الأولى: -

استبيان المقابلات: مقتبس من **Maalim Issack et al., (2021)** وتم تعديله من قبل الباحثة في ضوء المحتوى المناسب ليناسب طبيعة الدراسة وتقييم معرفة الأمهات حول الإسعافات الأولية للاختناق وترجم من قبل الباحث إلى اللغة العربية، وتألف من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: خصائص الأمهات: مثل عمر الأمهات، عدد الأطفال، المستوى التعليمي، المهنة، محل الإقامة (حضري أو ريفي) والحالة الاجتماعية.

الجزء الثاني: خصائص الأطفال: مثل العمر والجنس والتعليم.

الجزء الثالث: معرفة الأمهات بالإسعافات الأولية للاختناق تم تصميم هذا الاستبيان لتقييم معرفة الأمهات حول الإسعافات الأولية للاختناق والذي يحتوي على سؤال مفتوح واحد حول الإسعافات الأولية للطفل عند الاختناق بالغاز و٤ أسئلة متعددة الخيارات حول العلامات والأعراض والأسباب والأنواع والوقاية والوقت الذهبي لتقديم الإسعافات الأولية.

الأداة الثانية: -

قائمة ملاحظه ممارسات الامهات

تم اخذه وذلك بعد مراجعة الإجراءات ذات الصلة من **Canadian Red Cross society (2012)**. تضمنت هذه القائمة المرجعية ثلاث ممارسات ، والتي تستخدم لتقييم ممارسات الأمهات تجاه الإسعافات الأولية للاختناق ، بما في ذلك الطفل المخنوق الواعي (مناورة هيمليش) ، والطفل المخنوق الواعي (ضربة الظهر والضغط على الصدر) ، والطفل المختنق فاقد الوعي (CPR).

الأداة الثالثة: مقياس تقييم مواقف الأمهات حول الإسعافات الأولية :

وهي مأخوذة من **(Ibrahim & Mustafa., 2016)** وترجمتها الباحثة إلى اللغة العربية لتتناسب مع طبيعة الدراسة ولتقييم موقف الأمهات من الاختناق في الإسعافات الأولية. يتكون هذا المقياس من سبعة عناصر ومصنفة إلى موافق بشدة ، موافق ، غير متأكد ، غير موافق وغير موافق بشدة.

النتائج:

- ١- فيما يتعلق بخصائص الأمهات التي تم دراستهم ، فقد وجد أن متوسط أعمارهن كان ٣٣.٢٤ سنة وأكثر من نصفهم (٥٣.٦٪) كانوا تعليم متوسط ، وحوالي نصف الأمهات يعيشون في المناطق الريفية. بالإضافة إلى ذلك، ٧٦.٤٪ من الامهات ربات بيوت و الغالبية (٩٠٪) من الأمهات الخاضعات للدراسة لم يأخذن أي برنامج تدريبي سابق على الإسعافات الأولية.
- ٢- فيما يتعلق بخصائص الاطفال، وجد أن أكثر من نصف الأطفال هم من الذكور (٦٢.٧٪) وكان متوسط أعمارهم ٤.٧ سنوات حوالي نصفهم (٥٠.٩٪) كانوا قبل سن الحضانة.
- ٣- فيما يتعلق بمجموع معرفة الأمهات فيما يتعلق بالاختناق، وجد أن ٦٥.٥٪ من الأمهات لديهن معرفة غير مرضية فيما يتعلق بالإسعافات الأولية. بينما ٣٤.٥٪ منهم لديهم معرفة مرضية.
- ٤- فيما يتعلق بإجمالي ممارسات الأمهات فيما يتعلق بالإسعافات الأولية للاختناق، كشفت الدراسة الحالية أن أكثر من ثلثي ٧٠.٩٪ من الأمهات لم تتمكن من اداء الإسعافات الأولية للاختناق.
- ٥- بالنسبة لاتجاهات الأمهات ، أظهرت الدراسة الحالية أن ٦٤.٥٪ من الأمهات لديهن مواقف إيجابية تجاه الإسعافات الأولية للاختناق في الوقت نفسه، كان لدى ٣٥.٥٪ منهم مواقف سلبية.
- ٦- أفادت هذه الدراسة بوجود علاقة ارتباط ايجابية ذات دلالة إحصائية بين المستوى المعرفي وممارسات واتجاهات الامهات التي تم دراستهم.

الخلاصة:

بناءً على نتائج أسئلة البحث، لخصت الدراسة أن ثلثي الأمهات التي تم دراستهم لديهم مستوى غير مرضٍ من المعرفة فيما يتعلق بالإسعافات الأولية للاختناق. وكشفت الدراسة أن أكثر من ثلثي الأمهات (٧٠.٩٪) لديهم ممارسات غير كامله فيما يتعلق بالاسعافات الوليه للاختناق. وأن أكثر من ثلثهم لديهم اتجاهات إيجابية فيما يتعلق بالإسعافات الأولية للاختناق.

هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين معرفه الأمهات وخصائصهم بشكل رئيسي ومستوى التعليم والمهنة وحضور البرامج التدريبية سابقا على الإسعافات الأولية للاختناق. أثبتت الدراسة أيضاً أن هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين ممارسات الأمهات ومستوى التعليم ومكان الإقامة والمهنة وحضور برنامج تدريبي سابق. كما كان هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين مواقف الأمهات وخصائصهم بشكل رئيسي ومستوى التعليم ومكان الإقامة والمهنة وحضور البرامج التدريبيه سابقاً ووجود حادث سابق. وأخيراً، كانت هناك علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المستوى الكلي لمعرفة الأمهات وممارستهم واتجاهاتهم.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن اقتراح التوصيات التالية:

- برامج تدريبيه مستمره للأمهات لزيادة الوعي وتحسين المستوى المعرفى للامهات وسلوكهن وممارساتهن فيما يتعلق بالإسعافات الأولية للاختناق.
- كتيبات مصورة بسيطة وملصقات وإرشادات للأمهات حول الإسعافات الأولية للاختناق.
- برامج توجيهيه باستخدام وسائل الإعلام مثل وسائل التواصل الاجتماعى لتنفيذها من أجل زيادة الوعي الصحى العام فيما يتعلق بالإسعافات الأولية للاختناق.