

تأثير نموذج الرعاية المرتكزة حول الاسرة علي مقدمي الرعاية للأطفال

المصابين بالهيموفيليا

رسالة

توطئة للحصول على درجة الدكتوراه فى علوم التمريض

(في تمريض صحة الأطفال)

مقدمة من

صابرين السيد محمود عبدالمقصود

مدرس مساعد بقسم تمريض الأطفال

كلية التمريض - جامعة الفيوم

تحت إشراف

أ.د/ سلمى السيد حسن

استاذ تمريض الاطفال

رئيس قسم تمريض الاطفال

كلية التمريض - جامعة عين شمس

أ.د/ صفاء صلاح اسماعيل

استاذ تمريض الاطفال

عميد كلية التمريض

كلية التمريض - جامعة حلوان

أ.م.د / فتحية السيد الغضبان

استاذ مساعد تمريض الاطفال

كلية التمريض - جامعة الفيوم

كلية التمريض

جامعة حلوان

٢٠٢٣



الملخص العربي

النتائج:

يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة على النحو التالي:

- ❖ فيما يتعلق بخصائص مقدمي الرعاية اللائي تمت دراستهن تبين أن أكثر من الثلثين (٧١.٧٪) من الامهات في الفئة العمرية ٢٥ > ٣٥ ، و ٤٥٪ منهم تم تعليمهن حتي المرحلة الإعدادية ، و ٧٨.٣٪ منهم كانوا لا يعملون ، و ٨٨.٣٪ منهم من المناطق الريفية و ٩٣.٣٪ منهم متزوجات.
- ❖ فيما يتعلق بخصائص الأطفال الذين تمت دراستهم ، وجد أن أكثر من نصف (٥١.٧٪) الأطفال في الفئة العمرية ٥ و ١٠ سنوات ، و ١٠٠٪ منهم كانوا من الذكور ، و ٥١.٧٪ منهم كانوا في المرحلة الابتدائية ، و ٩٥٪ منهم تم تشخيصهم بالهيموفيليا أ.
- ❖ فيما يتعلق بالتاريخ الطبي السابق للأطفال الذين تمت دراستهم ، ذكر أن أكثر من ثلثي (٧١.٧٪) الأطفال قد تم تشخيصهم بالهيموفيليا في عمر أقل من سنتين ، و ٩١.٧٪ منهم أصيبوا بالنزيف المفصلي لأول مرة ، و ٧٥٪ منهم تتم متابعتهم للعلاج بانتظام و ٦٠٪ منهم يلتزمون بالمتابعة في العيادات الخارجية.
- ❖ فيما يخص معلومات مقدمي الرعاية عن الهيموفيليا ، وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية قبل / بعد التدخل فيما يتعلق بمجموع معلومات مقدمي الرعاية بالهيموفيليا قبل / بعد التدخل. وجد أن ٤٥٪ من مقدمي الرعاية لديهم معلومات إجمالية مرضية قبل التدخل ، مقارنة بالأغلبية ٨٣.٣٪ منهم بعد التدخل.
- ❖ فيما يخص ممارسات مقدمي الرعاية تجاه رعاية أطفالهن ، فقد وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بمجموع ممارسات مقدمي الرعاية قبل / بعد التدخل. وجد أن ٣٦.٧٪ من مقدمي الرعاية اللائي تمت دراستهن لديهم ممارسات كافية فيما يتعلق برعاية

أطفالهن المصابين بالهيموفيليا قبل التدخل ، مقارنةً بالأغلبية ٨٠٪ منهم كان لديهم ممارسات كافية فيما يتعلق برعاية أطفالهن المصابين بالهيموفيليا بعد التدخل.

❖ فيما يتعلق بنمط التأقلم لمقدمي الرعاية اللائي تمت دراستهن ، وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بنمط التأقلم الكلي لمقدمي الرعاية اللائي تمت دراستهن قبل / بعد التدخل. وجد أن ٢٠٪ من مقدمي الرعاية اللائي تمت دراستهن لديهم تدخل جيد قبل التدخل ، بينما ٦١.٧٪ منهم كان لديهم تدخل جيد بعد التدخل.

❖ فيما يتعلق بالرعاية المرتكزة حول الأسرة لمقدمي الرعاية اللائي تمت دراستهن ، وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بالرعاية المرتكزة حول الأسرة قبل / بعد التدخل. وجد أن ٣٥٪ من مقدمي الرعاية اللائي تمت دراستهن لديهم تصور عالٍ حول المفهوم الأساسي للرعاية المرتكزة حول الأسرة قبل التدخل ، بينما ٧٥٪ منهم لديهم تصور عالٍ حول المفهوم الأساسي للرعاية المرتكزة حول الأسرة بعد التدخل.

❖ وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين معلومات مقدمي الرعاية عن الهيموفيليا والمستوى التعليمي ومعلومات مقدمي الرعاية عن الهيموفيليا لديهم بينما لم يكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين خصائص مقدمي الرعاية (العمر، مكان إقامتهم ، وظيفتهم والحالة الاجتماعية) ومعلومات مقدمي الرعاية عن الهيموفيليا بعد التدخل.

❖ وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين ممارسات مقدمي الرعاية في تقديم الرعاية الكاملة لأطفالهن المصابين بالهيموفيليا والمستوى التعليمي لديهم بينما لم يكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين خصائص مقدمي الرعاية (العمر، مكان إقامتهم ، وظيفتهم والحالة الاجتماعية) ودور مقدمي الرعاية في تقديم الرعاية الكاملة لأطفالهن المصابين بالهيموفيليا بعد التدخل.

❖ وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين خصائص مقدمي الرعاية (العمر، وظيفتهم والمستوى التعليمي) ومدى تكيف مقدمي الرعاية مع أطفالهن المصابين بالهيموفيليا بينما لم يكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين خصائص مقدمي الرعاية (مكان إقامتهم والحالة الاجتماعية) وتكيف مقدمي الرعاية في تقديم الرعاية الكاملة لأطفالهن المصابين بالهيموفيليا بعد التدخل.

❖ وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الرعاية المرتكزة حول الأسرة ومعلومات مقدمي الرعاية عن الهيموفيليا قبل وبعد التدخل.

- ❖ وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الرعاية المرتكزة حول الأسرة ودور مقدمي الرعاية في تقديم الرعاية الكاملة لأطفالهن المصابين بالهيموفيليا قبل وبعد التدخل.
- ❖ كان هناك ارتباط إيجابي ذي دلالة إحصائية عالية لمقدمي الرعاية بين معرفتهن وممارستهن الكلية والتكيف الكلي والرعاية المرتكزة حول الأسرة قبل وبعد التدخل.
- ❖ كان هناك ارتباط إيجابي ذي دلالة إحصائية عالية لمقدمي الرعاية بين ممارستهن الكلية والتكيف الكلي والرعاية المرتكزة حول الأسرة قبل وبعد التدخل. كما وجد علاقة ارتباط إيجابي ذي دلالة إحصائية بين التأقلم الكلي والرعاية المرتكزة حول الأسرة قبل وبعد التدخل.