



**أداء الممرضين تجاه العناية بالأطفال حديثي  
الولادة الذين يعانون من متلازمة  
استنشاق العقي:  
دراسة تقييمية  
رسالة**

توطئة للحصول علي درجة الماجستير  
في تمريض حديثي الولاده

**مقدمة من**

**ياسمين محروس محمد سيد**  
بكالوريوس علوم التمريض (2016)  
معيد بقسم تمريض الأطفال  
كلية التمريض / جامعة الفيوم

كلية التمريض  
جامعة عين شمس

-2023-

أداء الممرضين تجاه العناية بالأطفال حديثي  
الولادة الذين يعانون من متلازمة  
استنشاق العقي:  
دراسة تقييمية

رسالة

توطئة للحصول علي درجة الماجستير  
في تمريض حديثي الولاده

تحت إشراف

**د. رندا محمد عدلي**

أستاذ تمريض الأطفال

كلية التمريض / جامعة عين شمس

**د. مني علي تنصوة**

أستاذ مساعد تمريض الأطفال

كلية التمريض / جامعة عين شمس

**د. حنان عبدالله محمد**

مدرس تمريض الأطفال

كلية التمريض / جامعة الفيوم

كلية التمريض

جامعة عين شمس

-2023-

## الملخص العربي

### المقدمة:

متلازمة استنشاق العقي هي مشكلة خطيرة حيث يتنفس فيها الطفل حديثي الولادة مزيجاً من العقي والسائل الأمنيوسي في الرئتين، وهو اضطراب تنفسي يهدد الحياة ويحدث عندما يطرد العقي في الرحم أو أثناء الولادة ويمكن ان تؤدي الى مضاعفات خطيرة للغاية مثل انسداد مجرى الهواء جزئياً أو كلياً، والتهاب الرئة، وارتفاع ضغط الدم الرئوي المستمر، وفشل الجهاز التنفسي الذي قد يؤدي الي الوفاة. تعد معلومات وممارسات الممرضين من متطلبات الجوده لتقديم الرعاية التمريضية للأطفال المصابين بمتلازمة استنشاق العقي.

### الهدف من الدراسة

تهدف هذه الدراس الي تقييم أداء الممرضين فيما يتعلق برعاية الأطفال حديثي الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي.

### أسئلة البحث:

- 1- ما هو مستوى معلومات الممرضين فيما يتعلق برعاية الأطفال حديث الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي؟
2. ما هو مستوى مهارات الممرضين فيما يتعلق برعاية الأطفال حديث الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي؟
3. ما هي اتجاهات الممرضين تجاه رعاية الأطفال حديثي الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي؟

### العينة وطرق البحث

تصميم البحث: تم استخدام التصميم الوصفي في هذه الدراسة.

### المكان:

أجريت هذه الدراسة في وحدة العناية المركزه لحديثي الولاده بمستشفى الفيوم العام التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية .

العينة: أجريت هذه الدراسه علي عينة متاحة أشتملت علي كلا من الممرضات العاملات في المكان المذكور سابقاً وذلك بغض النظر عن خصائصهم.

أدوات البحث تم جمع البيانات من خلال استخدام الأدوات التالية:

- 1- إستمارة إستبيان تم تصميمها مسبقاً من قبل الباحثة باللغة العربية وتنقسم الي جزئين لجمع البيانات التالية:

الجزء الأول: بيانات عن خصائص العينة:

1. خصائص الممرضين (العمر والجنس ومستوى التعليم وسنوات الخبرة وحضور الدورات التدريبية).

2. خصائص الأطفال حديثي الولادة (العمر الرحمي والجنس ونوع الولاده والوزن).

**الجزء الثاني:** هذا الجزء خاص بمعلومات الممرضين فيما يتعلق بمتلازمة استنشاق العقي في الحضانات مثل: (التعريف العوامل المساعدة، الاعراض والعلامات، التشخيص، المضاعفات والرعاية التمريضية لمتلازمة استنشاق العقي...الخ).

**2- قوائم ملاحظة الأداء لتقييم الممارسات الفعلية للممرضين ( قياس نسبة تشبع الاكسجين بالدم، تحليل غازات الدم ،العلاج بالاكسجين عن طريق الانف والفم وصندوق الرأس،التشفيط عن طريق الانف والفم والانبوبة الحنجرية، العلاج باستخدام جهاز السباب ،العلاج باستخدام جهاز التنفس الصناعي ، تقليل الألم و التوتر لحديثي الولادة، العلاج الصدري،)**

**3- مقياس اتجاه الممرضين : لتقييم اتجاهاتهم بخصوص متلازمة استنشاق العقي. الدراسة الاستطلاعية:**

تم عمل دراسة استطلاعية لاختبار كفاءة ومصداقية أدوات جمع البيانات ومكان جمع البيانات، وقت إستيفاء أدوات جمع البيانات. وتم عمل التعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاستطلاعية (حذف، اضافة او تعديل): ومن ثم صياغة أدوات جمع البيانات في شكلها النهائي قبل إستخدامها وتم استبعاد هؤلاء الممرضين.

#### مجال الدراسة:

تم جمع البيانات من الاول من فبراير حتى نهاية يوليو 2022 . قامت الباحثة بإعطاء فكرة موجزة عن طبيعة وهدف الدراسة وأكدت علي سرية المعلومات وأنها تستخدم للبحث العلمي فقط. تواجدت الباحثة يومين في الأسبوع (السبت و الثلاثاء) في نوبات الصباح وبعد الظهر. قامت الباحثة بتجميع البيانات باستخدام أدوات البحث السابق ذكرها من خلال مقابلة وملاحظة الممرضين بشكل فردي لتحديد المعلومات الأساسية وتقييم أدائهم أثناء تقديم الرعاية الفعلية للأطفال حديثي الولادة.

#### أهم نتائج الدراسة كالتالي:

- أوضحت الدراسة أن متوسط عمر الممرضات كان  $26.54 \pm 2.331$  عام، كما تبين أن أكثر من نصفهن (52.9%) كان لديهن خبره لمدته من خمسة الي اقل من عشر سنوات في مجال العناية المركزه للأطفال حديثي الولادة، كما أن أعلي نسبة من الممرضين (85.7%) من خريجي المعاهد الفنية للتمريض.
- وجد أن جميع الممرضين (100%) كانوا إناثاً وان أكثر من نصفهم (52.9) لم يسبق لهن حضور أي دورات تدريبية حول متلازمة استنشاق العقي.
- أقل من نصف الأطفال حديثي الولادة (47.1%) كان العمر الرحمي أكثر من 36 أسبوعاً ، ثلثي العينه كانوا ذكوراً ، وفيما يتعلق بنوع الولادة معظم الاطفال تم ولادتهم قيصرياً (91.4%) و 61.4% تراوحت أوزانهم بين 3 < 3500 كجم عندالدخول.

- وجد أن 74% من المرضين الخاضعات للدراسة يتمتعن بمستوى متوسط من المعلومات فيما يتعلق برعاية الاطفال حديثي الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي بينما كان لدي أكثر من ربعهن (26%) مستوى ضعيف من المعلومات.
- وجد أن معظم المرضين الخاضعات للدراسة (94%) كان لديهن مستوى إجمالي غير مرضى من الممارسات فيما يتعلق برعاية الاطفال حديثي الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي.
- وجد أيضا أن معظم المرضين (94%) الخاضعات للدراسة كان لديهن سلوك إيجابي فيما يتعلق برعاية الاطفال حديثي الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي

#### الخلاصة

يمكن أن نستخلص من هذه الدراسة أن معظم المرضات الخاضعات للدراسة كان لديهن مستوى متوسط من المعلومات، و معظمهم لديهن مستوى غير مرضي من الممارسات فيما يتعلق برعاية الاطفال حديثي الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي ، بينما كان لدي معظمهن سلوك ايجابي فيما يتعلق برعاية الاطفال حديثي الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي

#### التوصيات:

#### وفي ضوء نتائج الدراسة يمكن التوصية بالاتي:

- رفع الوعي للممرضات في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة لتحسين معلوماتهن وممارستهن فيما يتعلق برعاية الاطفال حديثي الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي
- يجب تطوير برامج تدريبية لاعداد المرضات الجدد قبل بدء العمل في الحضانات
- توفير دليل إجراءات فيما يتعلق برعاية الاطفال حديثي الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي
- توفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة لرعاية الاطفال حديثي الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي.
- إعداد وتقديم برامج تعليمية تدريبية بصفة دورية لتحسين معلومات وممارسات المرضات تجاه رعاية الاطفال حديثي الولادة المصابين بمتلازمة استنشاق العقي
- تطبيق هذه الدراسة على عينة أكبر وفي نطاق أوسع وبمختلف الوحدات لتعميم نتائج البحث.