

بيانات تستوفي بواسطة المتقدم:- د. إيفون صابر شكري

لوظيفة المتقدم لها الباحث: أستاذ مساعد

رقم البحث (3) نوعه :- (مشارك)

عنوان البحث باللغة الإنجليزية:-

Are Psychiatric Nurses More Vulnerable to Domestic Violence Compared with Nurses from Other Specialties?

عنوان البحث باللغة العربية:-

هل التمريض النفسي أكثر عرضة للعنف الأسري مقارنة بالتمريض من تخصصات أخرى؟

المشاركون في البحث:

د. إيفون صابر شكري مدرس التمريض النفسي والصحة النفسية جامعة الفيوم

د. نجوى احمد محمد سويلم أستاذ مساعد التمريض النفسي والصحة النفسية جامعة جنوب الوادي

مكان النشر:

American Journal of Nursing Research, 2017, Vol. 5, No. 6, 226-234

هل البحث معتمد على رسالة علمية () نعم () لا (√)

- ملخص البحث المصغر باللغة العربية :

تعاني النساء ، وخاصة النساء العاملات ، من عنف منزلي أو شريك عنيف في جميع أنحاء العالم. الممرضات ليست استثناء.

هدفت الدراسة مقارنة حجم العنف الأسري وتأثيره على ممرضات الطب النفسي مقارنة بالممرضات من التخصصات الأخرى. أجريت هذه الدراسة مقارنة مستقطعه على 120 ممرضة نفسية من مستشفى العباسية للأمراض النفسية و 120 ممرضة في تخصصات أخرى من مستشفى الزيتون. تم جمع البيانات باستخدام استبيان مُدار ذاتياً مع مقياس HITS (الأذى والإهانة والتهديد والصراخ) للتعرض للعنف المنزلي ومقياس تجربة المرأة في الضرب (WEB) لتقييم المعاني التي تنسبها النساء إلى تعرضهن للعنف المنزلي . استمر العمل الميداني من شهر أبريل إلى شهر يونيو 2017. كانت الخصائص الديموغرافية للممرضات في المجموعتين مماثلة. المزيد من الممرضات في مجموعة الطب النفسي لم يشاركوا في نفقات المنزل ، وكان منزل مستقل ، وكان عملهم يؤثر على الاحتياجات المنزلية ، والعلاقات الزوجية ، وكان طلب ترك العمل من قبل الزوج . فكر العديد من ممرضات الطب النفسي ترك العمل نتيجة للعنف المنزلي .

في التحليل متعدد المتغيرات ، كانت المؤشرات الإيجابية المستقلة لدرجات HITS هي عمر الممرضة عند الزواج وعمر الزوج ومشاركة نفقات المنزل والعمل الإضافي والعمل الذي كان له تأثير سلبي على الحياة الزوجية ، في حين أن التنبؤات السلبية كانت ممرضين للأمراض النفسية ، العمر ، ويعيشون في منزل مستقل. بالنسبة لدرجة التأثيرات ، كان التنبؤات الإيجابية ممرضين نفسيين ، ولديهم أطفال ، ولهم عمل له تأثير سلبي على الحياة الزوجية ، بالإضافة إلى درجة HITS ، في حين أن التنبؤات السلبية هم الدخل والعمل من أجل الحاجة. في الختام ، فإن ممرضات الطب النفسي أقل عرضة للعنف المنزلي ، مقارنة بالتخصصات الأخرى ؛ ومع ذلك ، فإن تأثير هذا العنف أكثر حدة بينهم ، مع ميل أعلى إلى ترك العمل من أجل هذا. يجب تحسين بيئة العمل ، وخاصة في الطب النفسي بجدول زمنية أكثر مرونة وساعات عمل أقل. يقترح إجراء مزيد من بحوث التدخل لتقييم فعالية النهج المختلفة للتعامل مع العنف المنزلي.

كلمات البحث: التمريض النفسي ، العنف الأسرى ، عنف الشريك الحميم