

البحث السابع

Transcervical Submandibular Approach: A Patient and Observer Scar Objective Score Appraisal

Adham A. ElAshwah, Nada M. H. Fahmy, Noha Y. Dessoky and Haytham Al-Mahalawy

النهج تحت الفك السفلي عبر العنق: تقييم النتيجة الموضوعية للندبة للمريض والمراقب

بحث مشترك مع زملاء في ذات التخصص والمجال

و سبق تقييمه

Alexandria Dental Journal

Volume 48, Issue 1, April 2023

<https://dx.doi.org/10.21608/adjalexu.2022.177328.1329>

الملخص العربي

الهدف: كان الغرض من هذه الدراسة هو تقييم الأداء الوظيفي والجمالي للشق تحت الفك السفلي عبر العنق للإجراءات المختلفة في المنطقة تحت الفك السفلي.

المواد والطرق: الدراسة عبارة عن سلسلة حالات محتملة لإدخال مقياس تقييم ندبة المريض والمراقب في تقييم ما بعد الجراحة للندبات الجراحية الخطية في منطقة الرقبة. كان متغير النتيجة الأولية هو أداء النتائج الوظيفية والجمالية للشق تحت الفك السفلي عبر عنق الرحم. تم تعيين الدلالة الإحصائية عند مستوى 5٪.

النتائج: تم تسجيل واحد وعشرين مريضاً مع إجراءات مختلفة في المنطقة تحت الفك السفلي في هذه الدراسة. أبلغ ثلاثة مرضى فقط عن خلل وظيفي خفيف عابر في الأسبوع الأول، والذي تبدد في فترة المتابعة اللاحقة. تراوح جانب المريض من مقياس تقييم الندبة من 7 إلى 19، بمتوسط سجل 10.2 ± 3.45 ومعدل رضا إجمالي يبلغ 85.7٪. تم الإبلاغ عنه من قبل المرضى. تراوح جانب المراقب لمقياس تقييم الندبة من 19 إلى 25، بمتوسط سجل 21.9 ± 1.42 . علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن درجة عالية من الموثوقية عند تقييم نتائج كلا المراقبين المختلفين ($P < 0.001$).

الاستنتاجات: منح الشق تحت الفك السفلي عبر العنق المرضى نهجاً أكثر أمناً، فيما يتعلق بسلامة العصب الفك السفلي الهامشي، ونتائج أكثر إرضاءً من الناحية الجمالية مع إرضاء المريض بشكل رائع. علاوة على ذلك، فإن استخدام مقياس تقييم المريض والندبة في تقييم ندبات الوجه الخطية يوفر أداة موثوقة ومتسقة و أداة سهلة التنفيذ.

الكلمات المفتاحية: نهج الشق تحت الفك السفلي عبر العنق، الفك السفلي، جودة الندبة.