

تحليل النتيجة الجمالية لتغطية الجذور باستخدام تقنية النفق  
بالاشتراك مع طعم النسيج الضام تحت الظاهري مقابل تقنية النفق  
بالاشتراك مع طعم اللثة الحرة المعدلة لعلاج انحسار اللثة فئة ميلر  
الثالثة تجربة سريرية عشوائية

رسالة مقدمة الى كلية طب الأسنان-جامعة القاهرة من أجل الاستيفاء الجزئي

بمتطلبات

شهادة الدكتوراه في

طب الفم وأمراض اللثة

نورهان عبدالله عبدالخالق نصر عنبر

بكالوريوس وماجستير طب الأسنان، جامعة القاهرة

كلية طب الأسنان

جامعة القاهرة

٢٠٢٢

لجنة الاشراف

ا.د منال حسني

استاذ طب الفم و علاج اللثة ، كلية الاسنان جامعة القاهرة

ا.د هاني النحاس

استاذ طب الفم و علاج اللثة ، كلية طب الفم جامعة القاهرة

د شيما سعيد نصر

مدرس طب الفم و علاج اللثة ، كلية الاسنان جامعة الفيوم

## الملخص العربي

أجريت هذه الدراسة تجربة سريرية معشاة ذات شواهد لتقييم النتيجة السريرية و الجمالية لاستخدام طعوم النسيج اللثوية الحرة المعدلة و طعوم النسيج الضامة تحت الظاهرة مع تقنية النفق التاجي المعدلة في علاج انحسار اللثة فئة ميلر الثالثة.

شارك في الدراسة الحالية اثنان وعشرون مريضا (ن=١١)، مجموعة النسيج اللثوية الحرة المعدلة ومجموعة النسيج الضامة تحت الظاهرة وتقييم عمق الركود و العرض و سمك الأنسجة المقترنة والارتفاع على الخط، عند ثلاثة اشهر و ستة اشهر.

في دراستنا، لم يلاحظ أي فرق ذي دلالة احصائية فيما يتعلق بالمعدل الجمالي لانحسار اللثة و تم تحسين النتائج السريرية و الجمالية بشكل ملحوظ في المجموعتين.

في الدراسة الحالية كانت طعوم النسيج الضامة تحت الظاهرة أكثر قدرة على علاج الانحسار من طعوم النسيج اللثوية المعدلة

حققت كلتا التقنيتين نفس المستوى من تغطية الجذور و النتيجة الجمالية. يمكن التنبؤ بمتوسط تغطية الجذر بنسبة ٧٧% عندما تم تنفيذ أي من الطريقتين في علاج انحسار اللثة فئة ميلر الثالثة