

قياس مدى رضا المرضى وتغيرات العظام فى حالة كندى الثنائى للفك السفلى باستخدام  
نوعيين مختلفيين من الوصلات دراسه سريرية عشوائية

رساله مقدمه الى كلية طب الاسنان جامعة القاهره  
كاستيفاء جزئي للمقررات المطلوبه للحصول على  
درجة الدكتوراه فى الاستعاضه الصناعيه

احمد محمد على حسان

بكالوريوس طب الفم والاسنان ٢٠٠٥

2013ماجستير الاستعاضه الصناعيه

كلية طب الفم والاسنان

جامعة القاهره

## المخلص باللغة العربية:

استهدفت هذه الدراسة المعملية تقييم قوة الابقاء لكل من الوصلات الخارجيه العاديه و الوصلات الخارجيه المصنوعه من ستهدفتم هذه الدراسة قياس مدى رضا المرضى وتغيرات العظام فى حالة كندى الثنائى للفك السفلى باستخدام نوعيين مختلفين من الوصلات ( دراسته سريره عشوائيه).  
تم فحص الحاله اكلينيكيًا وبالاشعه وعمل مفاص اولي لدراسة الحاله ثم نحت الاسنان الخلفيه السفليه الضاحك الاول والثاني بالجانبين لاستقبال كوبرى معدنى مغطى بالبورسلين ينتهي بوصلات فى كلا المجمعتين (المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه )

بروفه للتركيبه المعدن واختيار لون البورسلين ثم بروفه للتركيبه بعد اضافه البورسلين.

عمل مفاص كلي للفك السفلي لعمل التركيبه الجزئيه بالجانبين.

و تم استنساخ النموذجين الى نموذجين من الجبس ليتم عليهم عمل الهياكل المعدنيه للاطقم الجزئيه.

بروفه للهيكل المعدني للتركيبه الجزئيه و عمل مفاص للجزء الخلفي المفقود منه الاسنان باستخدام الهيكل المعدني و عمل عضه شمع واختيار لون وحجم الاسنان المناسب وفي الزياره التاليه تم عمل بروفه للاسنان.

استلام التركيبه الجزئيه بعد اختبارها والتأكد من عدم وجود مشاكل للمريض ولكن بعد لصق التركيبه الثابته.

تسجيل مدى رضا المريض عن التركيبه وعمل اشعه لايضاح ارتفاع وكثافة العظم حول الاسنان السفليه الخلفيه في نفس يوم استلام التركيبه وبعد ثلاثة وستة و تسعة اشهر من استلام التركيبه.

### **اظهرت النتائج ان**

-مدى رضا المريض عن التركيبه بالمجموعه الثانيه اعلي من مدى رضا المريض بالمجموعه الاولى.

-هناك تغير فى ارتفاع وكثافة العظم وهذا التغير غير مؤثر فى محصله نتائج المجموعتين.

## الكلمات الدالة:

وصلات خارجيه ، رضا المريض ، تغيرات العظم ، طقم جزئى حالات كينيدي التقسيم الأول