

الكشف المبكر عن الأعراض الاكتئابية عند طفل الروضة وعلاقته ببعض المتغيرات (النوع - الذكاء - الترتيب الميلادى)

إعداد / رانيا محمد على قاسم

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف المبكر عن الأعراض الاكتئابية لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة وكذلك التعرف على مدى انتشار تلك الأعراض الاكتئابية لدى أطفال المستوى الثانى للروضة التى تتراوح أعمارهم من (٥-٦ سنوات) كما حاولت أيضا التعرف على ما إذا كان هناك فروق بين الذكور والإناث في الأعراض الاكتئابية للأطفال في تلك المرحلة العمرية مع محاولة التعرف على علاقة تلك الأعراض الاكتئابية بمستوى ذكاء الطفل والترتيب الميلادى له، تكونت العينة من ٣١٦ طفلاً مقسمين إلى ٣٠٣ طفل ذكر و٣١٣ طفلاً إناثا تم استخدام مقياس الأعراض الاكتئابية من إعداد الباحثة وتألف المقياس من صورتين : صورة للأم وصورة للمعلمة وكذلك مقياس جود انف هاريس للذكاء للتعرف على نسبة ذكاء الطفل واستماره بيانات أولية للتعرف على الترتيب الميلادى للطفل، وتوصلت النتائج إلى أن نسبة انتشار الأعراض الاكتئابية بين أطفال العينة تقدر بحوالي ٤٨,٦٢ عند نسبة ٥٠% وأن الإناث كان مستوى الأعراض الاكتئابية لديهم أعلى من الإناث وحظى الطفل الأكبر على نسبة أعلى في الأعراض الاكتئابية يليه الطفل الأخير.