

الشقيقة وعلاقتها بعوامل الخطورة الأخرى بالإصابة بالسكتة الدماغية الحادة ومتلازمة الشريان التاجي الحادة

مكان وتاريخ النشر:

Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg (2022) 58:80

<https://doi.org/10.1186/s41983-022-00508-3>

ISSN: 1687-8329

ملاحظات:

- بحث غير مستخرج من رسالة
- هذا البحث لم يسبق تقييمه

أسماء الباحثين:

د/ أسامة محمود ممتاز

أستاذ مساعد الحالات الحرجة - كلية الطب - جامعة الفيوم

أ.د/ ايناس محود حسن

أستاذ الأمراض العصبية - كلية الطب - جامعة المنيا

أ.د/ نيرمين على حمدي

أستاذ الأمراض العصبية - كلية الطب - جامعة المنيا

أ.د/ محمد عبد الفتاح يحيى

أستاذ الأمراض العصبية - كلية الطب - جامعة المنيا

ط/ محمد خلف عفيفي

استشاري الأمراض العصبية بالتأمين الصحي - المنيا

المخلص العربي

تمت دراسة الصداع النصفي (الشقيقة) مؤخراً كعامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية وربط محتمل لنطاق أوسع من اضطرابات الأوعية الدموية الدماغية بما في ذلك الذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب. تهدف هذه الدراسة الى دراسة الصداع النصفي وعلاقته بعوامل الخطورة الأخرى في المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية الحادة وعلاج متلازمة الشريان التاجي الحاد (ACS). قمننا بدراسة 200 مريض ، و 114 مريضاً يعانون من مرض السكتة الدماغية الحادة و 86 مريضاً مصاباً بمتلازمة الشريان التاجي الحاد ، بالإضافة إلى 850 مشاركاً ضابطاً. خضع جميع المرضى لتقييم سريري ومختبري مفصل ؛ بما في ذلك تقييم عوامل الخطر التقليدية. تم إخضاع جميع مرضى السكتة الدماغية الحادة لفحص الأشعة المقطعية. تم تشخيص متلازمة الشريان التاجي الحادة سريرياً وفحص تخطيط القلب والإنزيمات القلبية المحددة. تم تشخيص الصداع النصفي وفقاً لجمعية الصداع الدولي وتم قياس تقييم شدة الصداع النصفي من خلال تقييم إعاقة الصداع النصفي. بتطبيق استبيان (MIDAS) النتائج: في المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية الإقفارية ، كانت نسب الخطر (RR) من الصداع النصفي 3.3 لجميع مرضى الصداع النصفي مقارنة بمرضى الضبط وكانت النسبة الأعلى لمرضى الصداع النصفي المصحوب بهالة MA بينما في مجموعة متلازمة الشريان التاجي الحاد ، كان عامل الخطر 2.75 لجميع مرضى الصداع النصفي وكانت نسبة الخطورة الأعلى مرة أخرى في (MA) . كما تم تسجيل ارتباط إيجابي بين شدة الصداع النصفي وشدة السكتة الدماغية وشدة التأثير في القلب الناتج عن متلازمة الشريان التاجي الحاد على الرغم من عدم وجود أهمية احصائية في مجموعة متلازمة الشريان التاجي الحاد. لم يكن هناك اختلاف كبير في نتائج المستشفى الخاصة بالوفاة في المرضى المصابين بالصداع النصفي في كلا المجموعتين . خلصت الدراسة الى ان المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي لديهم مخاطر أعلى من المرضى غير المصابين بالصداع النصفي لكل من مرضى السكتة الدماغية الحادة ومرضى متلازمة الشريان التاجي الحاد وتوصي الدراسة بتقييم الصداع النصفي كعامل خطورة والاختبار به في وضع الخطط العلاجية لتقليل الإصابة بالسكتة الدماغية الحادة ومتلازمة الشريان التاجي الحاد