

بطاقة تسجيل البحث الرابع

● عنوان البحث

Intrauterine arterial pseudoaneurysm, a rare cause
of per vaginal bleeding.

● التمدد الشرياني الدموي الكاذب داخل الرحم ، كسبب نادر لنزيف المهبل

أسماء الباحثين وأدوارهم :

التوقيع	دور الباحث	الكلية	التخصص	الاسم	
	فكرة البحث- جمع المادة العلمية- تقييم الحالات – متابعة إجراء الأشعات و كتابة تقاريرها و استخلاص النتائج – كتابة البحث و متابعة النشر	طب الفيوم	الأشعة التشخيصية	اشرف طلعت يوسف حسين	

● ملحوظات : بحث منفرد دولي منشور تم اقتباسه للنشر ٤ مرات (cited 4 times)

● مكان إجراء البحث : مركز خاص للموجات فوق الصوتية

● مكان نشر البحث : **Journal of Ultrasound**

● تاريخ النشر : مجله الموجات فوق الصوتية المجلد (21) 2018

البحث الرابع :- التمدد الشرياني الدموي الكاذب داخل الرحم ، كسبب نادر

لنزيف المهبل

ملخص البحث :-

قيمت الدراسة الحالية حالتين نادرتي الحدوث من نزيف المهبل بعد تمدد الأوعية الدموية الشرياني الكاذب داخل الرحم. كل حاله كانت تشكو من نوبات متقطعة من نزيف مهبل غزير حالة واحدة لها تاريخ من الولادة القيصرية والأخرى حالة بعد كشط الرحم.

يمكن أن يحدث تمدد الأوعية الدموية الكاذب داخل الرحم بسبب إصابة رضحية في جدار الوعاء الدموي مع التكوين اللاحق للورم الدموي حول الشريان الذي يسيل مكونًا كيسًا دمويًا حول الشريان ، والذي يتواصل من خلال الرقبة الضيقة مع تجويف الشرايين كما ان انفجار هذا التمدد الشرياني يؤدي الى نزيف شديد الغزارة قد يهدد الحياة وقد يحدث هذا الانفجار تلقائيًا أو بعد فحص مهبل .

وتعتبر الموجات فوق الصوتية عبر المهبل بمساعدة الدوبلكس الملون أداة دقيقة للتقييم .

كما يستعرض البحث مختلف الوسائل التي تتبع لعلاج هذا التمدد الشرياني الكاذب سواء الجراحية او الطرق التي تعتمد على الأشعة التداخلية باستخدام الموجات فوق الصوتية ومميزات كل منها وعيوبه