

البحث الثالث :

عدوى فيروس الاشتان بار كسبب لتضخم الغدد الليمفاوية بالرقبه عند الأطفال
بحث منشور في :

Int J Pediatric Otorhinolaryngology 2011;75:564-7

الملخص العربي:

إن تضخم الغدد الليمفاوية بالرقبة هي مشكلة منتشرة في الأطفال وغالباً ما يكون سبب التضخم هو تضخم تفاعلي أو وجود التهاب بميكروب محدد أو تضخم سرطاني. و تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى انتشار عدوى فيروس الاشتان بار بين الأطفال الذين يعانون من تضخم الغدة الليمفاوية بالرقبة كما تهدف أيضاً إلى تقييم الاعراض الاكلينيكية للمرض بين المرضى الأطفال. و قد تم عمل فحص الدم الخاص بفيروس الاشتان بار في ١٦٠ طفل ممن يعانون من تضخم الغدة الليمفاوية بالرقبة. و قد تم عمل تقييم اكلينيكي لأعراض المرض في الحالات التي اعطت نتائج ايجابية في تحليل الاجسام المضادة لغطاء الفيروس (VCA-IgM, VCA-IgG). و تشير النتائج إلى أن ١٥% من الحالات قد اعطت نتائج ايجابية لتحليل فيروس الاشتان بار الخاص و كانت كل الحالات تعانى من وجود تضخم بالغدد الليمفاوية في الجزء الخلفي من الرقبة. كما ان ٧٠,٨% من الحالات كانت تعانى من وجود ارتفاع في درجة الحرارة و ٦٦,٦% كانت تعانى من التهاب بالحلق و اللوز. و تشير النتائج أيضاً إلى أن ٥٨,٣% كانوا يعانون من تضخم بالطحال، ٢٥% يعانون من تضخم بالكبد و ٤١,٦% يعانون من تضخم عام بالغدد الليمفاوية. في حين ان الطفح الجلدي وجد في ١٢,٥% من الحالات وكل من تورم الجفن و طفح سقف الحلق وجد في ٨,٣% من الحالات. و تستنتج الدراسة إلى ان عدوى فيروس الاشتان بار ليس نادراً كسبب لتضخم الغدد الليمفاوية بالرقبة عند الأطفال. و قد يمثل تضخم الغدد الليمفاوية في الجزء الخلفي من الرقبة في الأطفال مفتاحاً للشك في عدوى فيروس الاشتان بار. في حين تشمل الاعراض الاكلينيكية الأخرى للمرض تضخم الكبد و الطحال، طفح جلدي، تورم بالجفن و طفح بسقف الحلق.