

بحث رقم (4)

عنوان البحث بالغة العربية

الإضطرابات الدهليزية الشائعة عند الأطفال في محافظة الفيوم: دراسة مقطعية

مكان و تاريخ النشر

The Egyptian Journal of Otolaryngology (2022) 38:26

<https://doi.org/10.1186/s43163-022-00222->

الخلفية: الدوار في سن الأطفال ليس حالة نادرة. ومع ذلك ، فإن نقص الوعي حول أسباب الدوخة عند الأطفال بالإضافة إلى عدم وجود إجراءات تشخيصية قياسية غالباً ما يؤدي إلى إجراءات غير ضرورية في إدارة هذه الحالات. كان الغرض من هذه الدراسة المقطعية هو تحديد انتشار وتكرار توزيع تشوهات التوازن عند الأطفال المصابين بالدوار. بالإضافة إلى ذلك ، تتم مناقشة فائدة الاستبيان كأداة فحص ودقته التنبؤية. وبالتالي ، يمكن تخصيص استراتيجية منظمة للمساعدة في عملية التشخيص ، والتي من المرجح أن تقضي على التقييمات غير الضرورية والمكلفة.

النتائج: اشتملت هذه الدراسة على 848 طفلاً ظهرت عليهم أي من أعراض الدوار المحولة إلى وحدة السمعيات الدهليزية بمستشفى جامعة الفيوم. كان التشخيص المقترح 23.9٪ من الحالات مصابة بالتهاب الأذن الوسطى إما بمفردها أو مصحوبة بأمراض أخرى ، بينما 17.6٪ يعانون من الدوار الانتيابي الحميد في الطفولة. وشكل مرضى الصداع النصفي 11.2٪ من الحالات. فقط 5.5٪ من الأشخاص يعانون من دوار الاستبيان دوار الأطفال والتشخيص النهائي الذي تم التوصل إليه من خلال التقييم الكامل للمرضى. الخلاصة: تشخيص الدوخة عند الأطفال أمر صعب. ومع ذلك ، فإن التاريخ المنظم المأخوذ بالاقتران مع الفحص الدهليزي أمر بالغ الأهمية لإنشاء تشخيص دقيق. يبدو أن الاستبيان أداة متوازنة لتشخيص الأطفال المصابين بالدوار