

البحث الأول (بحث مشترك غير مشتق من رسالة)

عنوان البحث باللغة العربية :

هل حقن الكورتيكو ستيرويد داخل الاذن الوسطي فعال في علاج حالات ارتشاح الاذن الوسطي ؟

عنوان البحث باللغة العربية :

هل حقن الكورتيكو ستيرويد داخل الاذن الوسطي فعال في علاج حالات ارتشاح الاذن الوسطي ؟

مكان النشر :

Egyptian Journal of Otolaryngology 2013;29,1:20-22

المشاركون فى البحث :

- رامز رضا بطرس
- وائل وجيه ناشد
- رامز صبري فهيم

- محمد شريف احمد عبد المنعم

الملخص العربي :

المقدمة:

ارتشاح الأذن الوسطى المزمن مشكلة صحية كبيرة على نطاق عالمي في الأطفال والبالغين وربما يمثل التفاعل بين الاستعداد الوراثي وعوامل التحفيز مثل العدوي والحساسية .

الاهداف

هل حقن الكورتيكو ستيرويد داخل الاذن الوسطي فعال في علاج حالات ارتشاح الاذن الوسطي ؟

طريقة البحث :

تمت هذه الدراسة على أربعة عشر مريض (٢٨ أذن) يعانون من ارتشاح الأذن الوسطى المزمن ، هؤلاء المرضى سبق معهم فشل العلاج الدوائي وارتجاع المرض بعد الجراحة أو رفضوا إجراء الجراحة . تم حقن المرضى أربعة مرات داخل الاذن الوسطى بـ ٠.٥ مل من مادة الديكساميثازون تقريباً " . في كل مرة تم التقييم الذاتي لتحسن الأعراض وكذلك التقييم الموضوعي بواسطة قياس السمع وضغط طبلة الأذن ما بعد الحقن الأخير بثلاثة شهور .

النتائج

في نهاية فترة المتابعة ، لا يوجد أي مريض أبدى أي تحسن ملحوظ في السمع أو امتلاء الأذن أو الطنين . كذلك قياس لسمع وضغط طبلة الأذن لم يظهروا وجود تحسن ملحوظ في أي مريض .

الاستنتاج

من ذلك نستنتج أن حقن الديكساميثازون داخل الأذن الوسطى غير مؤثر في علاج حالات ارتشاح الأذن الوسطى المزمن .

