



كلية الطب



جامعة الفيوم
Fayoum University

5. البحث الخامس: بحث جماعي منشور

Evaluation of Early Outcomes of Feminizing Genitoplasty in Virilized

Female Children with Congenital Adrenal Hyperplasia

تقييم النتائج المبكرة لتجميل الاعضاء التناسلية

في الإناث التي تعاني من زيادة هرمون الذكورة بسبب تضخم الغدة الكظرية

الملخص العربي:

الخلفية والمنطق:

تضخم الغدة الكظرية الخلقي في الإناث يؤدي إلى تذكير في الأعضاء التناسلية الخارجية ومسالك الجهاز البولي التناسلي السفلي. العلاج الهرموني يسيطر على اعتلال الغدد الصماء. ويشار إلى إصلاح الجراحة للسماح بتربية الاطفال الإناث بالأعضاء التناسلية الخارجية مطابقة لجنسها وتجنب المضاعفات النفسية. ويعتقد أن الجراحة في مرحلة مبكرة تكون أسهل وأفضل من النتائج التي تم تأجيلها إلى مرحلة المراهقة.

الأهداف:

لدراسة التشوهات التشريحية الوراثية للإناث في الأعضاء التناسلية الغير نمطية بسبب تضخم الغدة الكظرية الخلقي وتأثيرها على الجراحة واستعراض التقنيات الجراحية لتأنيث الجنين ونتائجها على المدى القصير في وقت مبكر. ونحن نهدف إلى تسليط الضوء على إدارة متعددة التخصصات لهذه الحالات المعقدة ومناقشة الصعوبات والتحديات التي تم تحقيقها خلال هذا المرضى والطرق:

وقد أدرجت الإناث بأعضاء التناسلية شاذة مذكرة وراثية قبل البلوغ بسبب تضخم الغدة الكظرية الخلقي. الدراسات الإشعاعية في شكل التصوير بالموجات فوق الصوتية لتصوير الرحم والغدد التناسلية والحينتوغرافيا لتخطيط ثم اتباع الجهاز البولي التناسلي. تم إجراء تقييم بالمنظار (تنظير المثانة) في وقت الجراحة مع وضع القسطرة في كل من المهبل والإحليل لتوجيه الإجراء الجراحي. جراحة تجميل الأعضاء التناسلية تهدف إلى تصحيح كامل في مرحلة واحدة لجميع الحالات مع تفضيل عملية نقل الجيب البولي التناسلي الجزئي.

النتائج:

تحقيق مظهر مقبول للإناث من الأعضاء التناسلية الخارجية، وتحقيق الحجم المناسب ووضع فتحات المهبل والإحليل، وحدوث مضاعفات على المدى القصير.

الاستنتاجات:

ويمكن إجراء عملية تأنيث الأنثى بأمان بين سن 6 أشهر وسنة واحد. بديلة المهبل وتآلهيل من الداخل للخارج هي مناسبة فقط حالات التلاقي المنخفضة. ونقل الجيب البولي التناسلي الجزئي هو تقنية آمنة وفعالة مناسبة لمعظم الحالات.