

# دراسة الموقع التشريحي لتقاطع الوريد الصافن مع الوريد الفخذي للأشخاص البالغين الذين يعانون من الدوالي

رسالة مقدمة

من الطبيب /محمد يس علي عثمان

بكالوريوس الطب والجراحة

توطئة للحصول على درجة الماجستير فى الجراحة العامة

تحت اشراف

أ.د/ اشرف حسين الغامري

استاذ الجراحة العامة وجراحة التجميل

كلية الطب\_جامعة الفيوم

أ.د احمد الهام فارس

استاذ مساعد الجراحة العامة وجراحة الاطفال

كلية الطب جامعة الفيوم

د.هاني حبشي

مدرس الجراحة العامة وجراحة الاورام

كلية الطب جامعة الفيوم

كلية الطب

جامعة الفيوم

## الملخص العربي

### المقدمة:

الدوالي هي حالة طبية شائعة للغاية. وكانت التقديرات الأكثر شيوعاً لانتشار الدوالي بين ٥٪ إلى ٣٠٪ في عدد السكان البالغين.

ويمكن أن تشمل هذه النتائج في المرضى الأوردة المتوسعة ودوالي شبكي غرامة. عوامل الخطر للدوالي: وتشمل الإناث، والشيخوخة، والتاريخ العائلي، ارتفاع عدد حالات الحمل والوقوف لفترات طويلة.

الدوالي يمكن أن تصنف على أنها أولية أو ثانوية. في الحالات التي يكون مصدر الدوالي فيها هو ارتداد الوريد الصافن الكبير، تكون المعاملة جراحية

فبالتالي الاستكشاف الدقيق لموقع تقاطع الوريد الصافني مع الوريد الفخذي وربط هذه الروافد مهم جداً

هناك دراسات قليلة جداً لمناقشة الموقع التشريحي لتقاطع الوريد الصافن مع الوريد الفخذي.

العديد من الكتب نص وصف الموقع كما هو أدناه إلى الرباط الأربي (skandaliks التشريح الجراحي ٢٠٠٧)

أو هو ٤ سم تحت الحديبة العانية (أطلس الأوردة السطحية في الأطراف السفلية ٢٠٠٧).

في هذه الدراسة سوف نبحث عن تقاطع الصافني الفخذي فيما يتعلق بالرباط الأربي وتجعد الأربية و الحديبة العانية

### الهدف من الدراسة:

١\_ دراسة الموقع التشريحي لتقاطع الصافني الفخذي فيما يتعلق بالرباط الأربي وتجعد الأربية و الحديبة العانية

٢\_ للحصول على الشق المثالي للوصول الى تقاطع الصافني الفخذي في عمليات جراحة الدوالي

### المرضى والوسائل:

المرضى الذين يعانون من المظاهر السريرية والادلة الاشعاعية لوجود قصور في  
تقاطع الصافني الفخذي