

احصار العصب الفرجى على الجانبين كمسكن بعد العمليات

طارق حجازى، نادر شعبان زكى

المقدمة: تعتبر مشكلة اليواسير والشرخ الشرجى من المشاكل الشائعة التى تواجه المرضى فى العالم بنسبة قد تتراوح الى ٤.٤% ومعظم العمليات تتم كإجراء بالعيادة الخارجية، وتعتبر العمليات من أنجح الطرق لعلاج اليواسير والشرخ ولكن الألم الشديد الذى يشعر به المريض بعد إجراء الجراحة قد تطيل بقاءه بالمستشفى وتستخدم العديد من مسكنات الألم مثل المرفين تحت الجلد أو طرق أخرى للتغلب على ذلك الألم. ويعتبر احصار العصب أو تخدير العصب الفرجى من الطرق التى قد تؤدي إلى تغلب المريض على هذا النوع من الألم.

طريقة البحث: تم اجراء هذه الدراسة بالقصر العينى جامعة القاهرة بين فبراير إلى سبتمبر ٢٠١٤ بعد موافقة قسم الجراحة وقد أجريت الدراسة على عدد ٥٠ مريض وقد تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين، مجموعة قد أجريت لهم عملية اليواسير والشرخ الشرجى دون احصار العصب الفرجى، والمجموعة الأخرى أجريت لهم الجراحة مع إحصار العصب الفرجى، وقد تم أخذ أقرار من المرضى بعمل تخدير أو احصار للعصب الفرجى.

نتائج البحث: قد أوجدت الدراسة أن احصار العصب الفرجى فى المرضى الذين أجريت لهم عملية اليواسير أو الشرخ الشرجى ساعد كثيراً فى تقليل نسبة الألم بعد العملية وقد أدى إلى قلة استخدام الأدوية المسكنة وقد أدى إلى شعور المرضى بالراحة بعد العملية فى الـ ١٢ ساعة الأولى بعد العملية.

خلاصة البحث: استخدام التخدير أو احصار العصب الفرجى على الجانبين بعد عمليات الشرخ يؤدي إلى نتائج رائعة فنتقليل نسبة الألم وكذلك تقليل كمية الأدوية المسكنة المستخدمة بعد العملية.

مكان وتاريخ النشر: مجلة القصر العينى للجراحة ، المجلد ١٦ ، عدد ٢ ، مايو ٢٠١٥