

البحث السابع

دراسة مقارنة حول تأثير تركيبتين موضعيتين لكريم عكبر النحل في الشكل العادي والنانو على التئام الجروح في الجرذان المسنة (دراسة هستولوجية وهستوكيميائية مناعية)

نهى عبداللطيف ابراهيم¹، وليد محمود رجب^{2,3}، علياء علي حسن⁴، ايناس محمد مرسى⁵، اسماء محمد السيد¹

- 1- قسم الهستولوجي - كلية الطب - جامعة الفيوم
- 2- قسم التشريخ والاجنة - كلية الطب - جامعة الفيوم
- 3- قسم التشريخ والاجنة - كلية الطب - جامعة الجلالة
- 4- قسم الكيمياء الحيوية - الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية - الجيزه
- 5- قسم الطب الشرعي والسموم - كلية الطب - جامعة الفيوم

Egyptian Journal of Histology (EJH) Accepted for publication 10/12/2022

النشر

الملخص العربي

الخلفية: يمكن أن يؤدي التقدم في السن إلى تأخر التئام الجروح. البروبوليس له تأثير جيد على الشفاء. **الأهداف:** تم إجراء هذا الفحص لتقييم ما إذا كانت كريمات البروبوليس (عكبر النحل) والنانوبروبوليس يمكن أن تساعد في التئام الجروح في الجرذان المسنة.

المواد والطرق: تم فصل خمسين من الجرذان البيضاء المسنة إلى أربع مجموعات: المجموعة الأولى (المجموعه الضابطة للجلد السليم) (5 جرذان) ؛ المجموعات الجريحة: المجموعة الثانية (المجموعه الضابطة الجريحة) (3 مجموعات فرعية ، 5 جرذان لكل منها) ؛ المجموعة الفرعية 2أ: تم تطبيق الكريم الحامل موضعياً مرة واحدة يومياً لمدة 7 أيام ؛ المجموعة الفرعية 2ب: مرة واحدة يومياً لمدة 14 يوماً ؛ والمجموعة الفرعية 2ج: مرة واحدة يومياً لمدة 21 يوماً ؛ المجموعة الثالثة (مجموعه البروبوليس) ، التي تم تقسيمها إلى 3 مجموعات فرعية كل منها 5 جرذان ، (المجموعة الفرعية 3 أ) تم تطبيق كريم البروبوليس موضعياً مرة واحدة يومياً لمدة 7 أيام ؛ (المجموعة الفرعية 3 ب) مرة واحدة يومياً لمدة 14 يوماً ؛ و (المجموعة الفرعية 3 ج) مرة واحدة يومياً لمدة 21 يوماً ، المجموعة الرابعة (مجموعه النانوبروبوليس) ، والتي تم تقسيمها إلى 3 مجموعات فرعية كل منها 5 جرذان ، وتم تطبيق كريم النانوبروبوليس موضعياً لنفس الفترات المذكورة أعلاه في المجموعة الثالثة. تم استخدام صبغة الهيماتوكسيلين والأيوسين ، والتفاعل الكيميائي النسيجي بيكرو سيربيوس الأحمر (picro Sirius red) ، و CD 105 المناعي في هذه الدراسة

النتائج: تحسن التئام الجروح بشكل ملحوظ في مجموعتي البروبوليس والنانو بروليس ، مع زيادة ملحوظة في معدل إغلاق الجرح وترسب الكولاجين.

الخلاصة: أكدت نتائج الدراسة الحالية أهمية CD105 في عملية التئام الجروح. بالإضافة إلى ذلك ، فقد أظهر مدى فعالية تركيبات البروبوليس والنانوبروبوليس في علاج الجروح المسنة. قد تكون هذه التقنية فعالة في علاج الجروح المزمنة بأمان وفعالية.

الكلمات المفتاحية: بروليس ، نانوبروليس ، المسنة ، التئام الجروح ، CD 105.