

البحث السادس 2015

دراسه وبائيه والاعراض الاكلينيكيه للسكتة الدماغية فى صعيد مصر (منطقة صحراوية)

المشاركون فى البحث:

- د.د. حمدي نجيب التلاوي أستاذ الأمراض العصبية-جامعه أسيوط
د.د. وفاء محمد فرغلي أستاذ الأمراض العصبية-جامعه أسيوط
د.د. رضا بدري أستاذ مساعد الأمراض العصبية- جامعة أسيوط
د.د. نزمين علي حمدي أستاذ الأمراض العصبية - جامعه المنيا
د.د. غيداء احمد شحاته أستاذ الأمراض العصبية- جامعه أسيوط
د.د. طارق احمد راجح أستاذ الأمراض العصبية- جامعه أسيوط
د.د. نبيل احمد متولي أستاذ مساعد الأمراض العصبية -جامعه الازهر اسيوط
د.د. ايناس محمود حسن أستاذ الأمراض العصبية -جامعه المنيا
د.د. سيد صبحي سيد بدوي أستاذ مساعد الأمراض العصبية- جامعه الفيوم
د.د. محمد عبد الفتاح يحيى أستاذ الأمراض العصبية- جامعه المنيا
د.د. محمد عبد الفتاح يحيى أستاذ الأمراض العصبية- جامعه المنيا
د.د. وائل طلعت سليمان أستاذ الأمراض العصبية -جامعه المنيا

الملخص العربى:

السكتة الدماغية هي سبب شائع للمرضي والوفيات في جميع أنحاء العالم. تحدث أربع حالات من كل خمس حالات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد معدل انتشار السكتة الدماغية في صعيد مصر ، والتعرف على الاعراض السريرية وعوامل الخطر المحتملة للسكتة الدماغية في هذه الفئة من السكان. **الطرق:** هي دراسة من الباب إلى الباب أجريت على جميع السكان في منطقة الخارجة (مثل الصحراء الغربية) ومدينة القصير (مثل الصحراء الشرقية). أجريت الدراسة على مرحلتين ، وكانت كل مرحلة تتكون من ثلاث مراحل (الفحص والتشخيص والتحقي. **النتائج:** كان معدل الانتشار الكلي لسكتة دماغية ٨,٥ / ١٠٠,٠٠٠ في السكان الذين تتراوح أعمارهم ٢٠ سنة وأكثر. وزاد ذلك مع تقدم السن وكان أعلى بين الذكور أكثر من الإناث في جميع الفئات العمرية باستثناء فترة الإنجاب (من ٢٠ إلى ٤٠ سنة). كان معدل انتشار السكتة الدماغية نتيجة جلطات المخ (٧,٢ / ١٠٠,٠٠٠) أعلى من السكتة النزفية (١,١ / ١٠٠,٠٠٠). كانت الشلل النصفي العرض الأكثر شيوعا للسكتة الدماغية. تم العثور على الصداع ، والتقيؤ ، والدوار لتكون مرافقات أكثر شيوعا من السكتة الدماغية النزفية. كان عامل الخطر الأكثر شيوعاً هو ارتفاع ضغط الدم ، يليه ارتفاع نسبة الدهون في الدم ومرض السكري. **الخلاصة:** إجمالي مدى انتشار السكتة الدماغية لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ سنة وأكثر في صعيد مصر (المنطقة الصحراوية) تقع ضمن النطاق الذي يتم تسجيله في البلدان النامية. وتشبه العوامل السريرية و عوامل الخطر تلك المسجلة من البلدان النامية والبلدان المتقدمة.

