

# دراسة مقارنة لإزالة أورام البطين الخارجى للمخ عن طريق القشرة المخية أو الجسم الثقبى

رسالة توطئة للحصول على درجة الدكتوراه فى جراحة المخ و الأعصاب

مقدمه من

طبيب/ محمد جابر عبد التواب  
ماجستير الجراحة العامة

تحت إشراف

الأستاذ الدكتور/ عصام محمد رشاد  
أستاذ جراحة المخ و الأعصاب  
كلية الطب- جامعة القاهرة

الأستاذ الدكتور/ محمد محمد محيى الدين  
أستاذ جراحة المخ و الأعصاب  
كلية الطب- جامعة القاهرة

الأستاذ الدكتور/ أشرف هشام أبو النصر  
أستاذ جراحة المخ و الأعصاب  
كلية الطب- جامعة القاهرة

الدكتور/ محمد حمدى السيسى  
أستاذ مساعد جراحة المخ و الأعصاب  
كلية الطب- جامعة القاهرة

كلية الطب  
جامعة القاهرة  
٢٠١٣

## الملخص العربي

تعد أورام البطين المخي الخارجي من الافات النادرة في الممارسة العامة لجراحة الأعصاب. معظم هذه الاورام حميدة ولا تزال تشكل الجراحة عنصرا هاما في علاجها.

تمثل الأورام الناشئة داخل بطينات المخ تحديا جراحيا فريدا بسبب عمق موقعها، والكبر النسبي لحجمها، وارتباطها بالإستسقاء المخي، لذلك فالتخطيط الجراحي لعلاج هذه الأورام يتطلب إجراء تقييم دقيق للأسلوب الأمثل للوصول إلى الآفة، وتوفير الكشف الكافي لاستئصال الورم و يعتبر النهج الجراحي الأمثل هو النهج الذي يوفر زاوية رؤية مباشرة، وحد أدنى من التراجع المخي كما يجنب التلاعب بالقشرة البليغة.

لقد ازدهرت عمليات إستئصال الأورام الناشئة داخل بطينات المخ عن طريق المنظار الجراحي على مدى العقد الماضي لكنها لا تخلو من بعض القيود عند التعامل مع أورام كبيرة الحجم.

الهدف من هذه الدراسة هو مقارنة استخدام التدخل الجراحي عن طريق القشرة المخية أو الجسم التقني وشملت هذه الدراسة ٥٠ مريضا من بين هؤلاء ٢٥ ذكر ٢٥ أنثى من مختلف الفئات العمرية.

كان المرضى يعانون من أورام متعددة مثل الأورام البطينية و أورام الضفيرة المشيمية الحليمية وأورام الخلايا النجمية و غيرها.

في النهاية نأمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة في كلا من التخطيط الجراحي وتقديم المشورة للمرضى وعائلاتهم.