

دراسة تأثير العلاج الكيماوى التحجيمى والعلاج الموضعى على المجموعة (د) من أورام الشبكية السرطانية عند الأطفال

تعد أورام الشبكية السرطانية عند الأطفال من أخطر الأورام التى قد تودى بحياة الطفل. ولكن مع تقدم وتوفر وسائل العلاج المختلفة أصبح فى الامكان الحفاظ على حياة الطفل وعينه وأحيانا الحفاظ على نظره فى مراحل متقدمه من المرض.

تظهر أورام الشبكية عند الأطفال عادة فى السنة الأولى من العمر والكثير من الحالات يتم تشخيصها فى أول سنتين من العمر. تعد السنين الأولى من عمر الطفل من أهم الأوقات التى يمكن فيها الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها والتعامل مع معوقات النمو المختلفة مما يقلل أو يمنع من خطر التأثير على حياة الطفل أو نظره.

نسبة نجاح هذه الدراسة تمثل ٦٦,٧٪ فى الحفاظ على عين الطفل من الاستئصال فى المرحلة (د) من المرض. وهذه النسبة تماثل بل و تتعدى النسب العالمية.

ان استخدام العلاج الكيماوى التحجيمى والعلاج الموضعى فى علاج حالات المجموعة (د) من أورام شبكية عيون الأطفال قد سمح بالحفاظ على عين الطفل من الاستئصال المتبع تقليديا فى مثل هذه الحالات. وقد توفرت الان مختلف هذه الوسائل فى القاهرة خاصة مع أمل بالانتشار فى مختلف أنحاء الجمهورية.

نحن نأمل فى التشخيص المبكر والتدخل السريع بأفضل وسائل العلاج فى حالات أورام شبكية عيون الأطفال مما يستوجب توفر الوحدات والمراكز المتخصصة لمثل هذه الحالات التى تسمح بالمتابعة المستمرة أيضا.