

## نتيجة انسداد الوريد البابى خارج الكبد فى الأطفال

### ملخص البحث

خلفية: انسداد الوريد البابى خارج الكبد (EHPVO) النامية بسبب انسداد الخثاري من الوريد البابى فى الأطفال عموما هو مرض حميد، وكان الهدف من هذه الدراسة وصف السريرية، وعوامل الخطر والمضاعفات والعلاج فى الأطفال الذين يعانون من EHPVO قدمت إلى وحدة طب الكبد، مستشفى الاطفال جامعة القاهرة ، مصر.

و جرى استعراض السجلات الطبية ل ١٤٥ طفلا (٨٩ من الذكور، ومتوسط العمر ١٠ عاما، ما بين ٧ أشهر ١٨ عاما) الذين تم تشخيصهم EHPVO بين عامي ١٩٨٨ و ٢٠٠٨.

النتائج: شملت السريرية نزيف فى ٥٨٪ وتضخم الطحال فى ٣٧٪. واعتبر لفترة طويلة وقت البروثرومبين فى ٢٦٪ ورفع إنزيمات الكبد فى ٦٪. على التنظير الأول، كانت دوالي المرئ الحالية فى ١٣١ (٩٠٪) من المرضى. من تلك الموضوعات، ١٠١ (٧٧٪) على الطب النفسى، ٧ (٥.٣٪) لديهم ربط الشريط و ١٤ (١٠.٦٪) وردت على حد سواء. تم إجراء التحقيق أهبة التخثر فى ٤٠ مريضا كشف: العامل الخامس لايدن تحور فى ١٢، C نقص البروتين فى ١١، عامل II طفرة فى ٦ ونقص مضاد الثرومبين الثالث فى ١ المرضى. أجريت خزعات الكبد فى ٦٨ مريضا كشف مختلطة بوابة تليف فى واحدة والحد الأدنى من تليف فى أربعة مرضى.

الخلاصة: المسببات المرضية ل EHPVO فى الغالبية العظمى من المرضى ما زال مجهولا. التشخيص العام هو جيد. حقن وربط الدوالي بالمرىء علاجات فعالة لوقف نزيف دوالي مع نتائج جيدة على المدى الطويل.