



البحث الخامس

Overactive bladder symptoms recurrence after sudden versus gradual weaning of Solifenacin

Ahmed Abdelbary, Ahmad Aref Al-Dessoukey, Ayman Salah Moussa, Mohamed Saif El-nasr, Akrm Ahmed Elmarakbi, Ahmed Medhat Ragheb, Ahmed Mohamed Elbatanouny, Ahmed Abdellateef, Osama Sayed, Amr Lotfy, Khaled Mohyelden, Amr Mohamad Abdelhamid, Ehab Mohamad Galal, Amr Massoud and Rabie M. Ibrahim.

African Journal of Urology (AFJU), December 2020, Published online: 14, p 1-6

عنوان البحث:

تكرار أعراض فرط نشاط المثانة بعد الفطام المفاجئ مقابل الفطام التدريجي لسوليفناسين

ملخص البحث:

خلفية: لتقييم ومقارنة معدل تكرار أعراض فرط نشاط المثانة بعد العلاج بالسوليفناسين في المرضى الذين توقفوا عن تناول الدواء فجأة مقابل أولئك الذين يفتمون الدواء تدريجياً بعد تحسن حالتهم.

أساليب: تضمنت دراستنا 60 مريضاً يعانون من أعراض فرط نشاط المثانة مجهول السبب وعولجوا بالسوليفناسين 5مجم مرتين يومياً لمدة شهر واحد. بعد تحسن حالتهم، قسمنا المستجيبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى أوقفت الدواء فجأة، بينما خضعت المجموعة الثانية للفطام التدريجي للدواء.

% و 60% بعد 1 و 3 أشهر في المرضى 33.3 نتائج: كان معدل تكرار أعراض فرط نشاط المثانة الذين توقفوا عن تناول السوليفناسين فجأة بعد تحسن الأعراض، بينما كانت 6.7% و 23.3% بعد 1 و 3 أشهر في المرضى الذين فطموا السوليفناسين تدريجياً.

استنتاج: بعد تحسن أعراض فرط نشاط المثانة، يمكن للقطام التدريجي للسوليفناسين أن يساعد في تقليل معدل تكرار الأعراض.