

## اسم البحث السابع:

مقارنة بين الاستئصال الكلي للمثانة واستئصال المثانة مع الحفاظ علي غلاف البروستاتا من حيث النتائج الوظيفية وتقديم الورم .

### ملخص البحث السابع :

**مقدمة البحث :** دراسة مقارنة بين الاستئصال الكلي للمثانة واستئصال المثانة مع الحفاظ علي غلاف البروستاتا من حيث العائد الوظيفي وتقديم الورم.

**المرض وأساليب البحث :** دراسة عشوائية علي 96 مريض بسرطان المثانة من ديسمبر 2014 إلي نوفمبر 2016 استبعد في الدراسة الحالات الأتية : الأورام من المرحلة الرابعة وكذلك وجود غدد ليمفوية للمرضي كذلك هرمون دلالة أورام البروستاتا أعلي من  $ng/dl4$

والمرضي الذين لديهم عينات إيجابية من عنق المثانة او مجري البول الخلفي الملتصق للبروستاتا والمرضي تم تقسيمهم الي مجموعتين المجموعة الأولى 51 مريض تم إجراء استئصال كلي للمثانة وتحويل طبيعي للبول عن طريق المجري الطبيعي والمجموعة الثانية 45 مريض تم إجراء استئصال للمثانة مع الحفاظ علي غلاف البروستاتا

تم إجراء قبل العملية اشعة تليفزيون من خلال فتحة الشرج وكذلك عينة من البروستاتا للمجموعتين لاستبعاد الحالات التي بها سرطان البروستاتا وتم المقارنة من حيث التحكم في البول ووظيفة الانتصاب للعضو الذكري في خلال 6 شهور و12 شهر وستين للمجموعتين.

**النتائج :** لا يوجد فرق واضح بين المجموعتين بالنسبة للمعلومات المدونة للمرض قبل العملية من حيث درجة الورم ومرحلة الورم ومكان الورم من خلال المنظار والعينة وأثناء العملية لا يوجد فرق واضح من حيث فقد الدم أو مضاعفات أو وقت العملية في المجموعتين ولكن وجد إرتفاع واضح في نسبة التحكم بالبول والقوة الجنسية في المجموعة 2 بالمقارنة بالمجموعة 1

16 حاله بنسبة 35.6% في المجموعة 2 وكذلك 4 حالات بنسبة 7.8% في المجموعة الأولى اظهروا أن كمية كبيرة من البول المتبقي بالمثانة بعد التبول واحتاجوا الي قسطرة من حين لآخر ووجد أن فرصة رجوع الورم لا يوجد فرق واضح بين المجموعتين من خلال عامين المتابعة .

### **الإستنتاج :**

استئصال المثانة مع الحفاظ علي غلاف البروستاتا حل جيد في حالات خاصة مع تحكم البول وقوة جنسية جيدة بدون تأثير علي تقدم الورم في خلال المتابعة لمدة عامين .