

البحث الثاني

انتشار سوء الإطباق باستخدام التصنيف الزاوي لدى طلاب طب الأسنان بجامعة الفيوم بمصر ((دراسة مسحية

الملخص العربي

: المواضيع

تكونت عينة الدراسة من 1000 طالبة (580 طالبة و طالب) يدرسون في كلية طب الأسنان جامعة الفيوم بالفيوم 420 الحكومة ، مصر. تراوحت الاعمار بين 18 و 23 سنة

أساليب

يجب على جميع الطلاب استيفاء المعايير التالية: الحصول على شهادة دائمة الأسنان بدون أي أسنان مفقودة ولا علاج تقويمي سابق كان معايير الاشتمال الرئيسية. تم تقييم الانسداد عند المرضى تم إرشادهم إلى الانسداد المركزي. تم فحص جميع الطلاب سريريًا على كراسي الأسنان بواسطة أخصائي تقويم أسنان واحد. البيانات التي تم جمعها كانت IBM SPSS محللة احصائيا. تم إجراء التحليل الإحصائي باستخدام Windows إحصائيات الإصدار 20 لنظام التشغيل

نتائج

أظهرت نتائج الدراسة أن 30.1% من العينة كانت طبيعية انسداد و 69.9% يعانون من سوء الإطباق. تم العثور على سوء إطباق من الدرجة الأولى في من الحالات ، يليها سوء الإطباق من الصنف الثاني بنسبة 20.2% وأخيراً 33.1% من سوء الإطباق من الصنف الثالث في 16.6% من

استنتاج

تم العثور على سوء إطباق الزاوية في 69.9% من العينة. الدرجة الأولى
كان سوء الإطباق أعلى نسبة يليه سوء الإطباق من الصنف الثاني
وأخيرا سوء الإطباق من الدرجة الثالثة.