

البحث الثالث

تأثير تصحيح العضة الأمامية على جودة الحياة لمجموعة من الأطفال المصريين خلال مرحلة الأسنان المختلطة.

الملخص العربي

موضوعي

تقييم تصحيح العضة الأمامية على نوعية حياة

(CPQ8) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8-10 سنوات باستخدام استبيان تصورات الطفل

أساليب

سبعون طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8-10 سنوات يبحثون عن علاج للأسنان الأمامية

عضة متصالبة ، تم اختيارها لهذه الدراسة السريرية. تأثير الاعتراض المبكر

علاج تقويم الأسنان لعضة الأسنان الأمامية على صحة فم الأطفال

باستخدام النسخة البرازيلية من (OHRQoL) تم تقييم جودة الحياة ذات الصلة

: ، في نقطتين زمنييتين مختلفتين (CPQ8-10) استبيان مدركات الطفل

بعد تصحيح: T1 قبل علاج عضة الأسنان الأمامية و T0:

عضة أمامية.

نتائج

ودرجات كل مجال صحي CPQ8-10 النتيجة الإجمالية لـ

النطاق الفرعي) للأطفال من كلا الجنسين انخفض بشكل ملحوظ بعد النهائي)

للنتيجة الإجمالية وجميع المجالات الصحية (المقاييس الفرعية). (P < 0.001) العلاج

باستثناء النطاق الفرعي للصحة العاطفية ، لم يكن هناك فرق كبير

في الموعد الأول ، إناث. (p > 0.05) بين درجات كلا الجنسين

(p < 0.001). كان لديه درجة أعلى بكثير من الرفاهية العاطفية من الذكور

: استنتاج

علاج تقويم الأسنان الاعتراضي المبكر للأطفال الذين يعانون من أسنان أمامية

OHRQoL العضة المتصالبة ضرورية لتحسين